

J. V. V.
MEDICINÆ

THERAPEVTICÆ

PARS: DE DYSCRASIA

CORPORIS HVMANI:

AVTHORE TIMOTHEO

BRIGHTO CANTABRIGIENSI:

MEDICINÆ DOCTORE.

Ad honoratissimum virum Dominum

Gulielmum Ceciliū: &c. literarum

patronum ac Mæcenatem summum.



LONDINI,

Excudebat Henricus Middletonus

impensis Thomæ Man.

1583.

[Handwritten signature]

MEDICINA

THEATRA

PARS DE DYS CRASIA

CORPORIS HUMANI

AVTHORE TYMOTHO

LEICHTO CANTABRIGIENSIS

MEDICINAE DOCTOR



4.56

LONDINA
Excusabat Henricus Middletonius
Impensis Thomae Mason

HONORATISSI-
MO VIRO D. GVLIEL-
MO CECILIO, PRÆCLARI
ordinis quem vocant Garterij
militi, Baroni de Burghley, summo
Angliæ Thesaurario, & Cantabrigienfis
Academiæ Cancellario dignissimo,
T. B. Cantabrigienfis S. P. D.



U M pri-
 mum in a-
 nimo ha-
 berem (ho-
 noratissime
 Cecili) me-
 dicinæ artem methodo expli-
 catam in vulgus ædere; &
 quæ apud me priuatim cōmen-
 tatus sum, cum alijs communi-
 care: id simul occurrebat; cuius
 nomini imprimis hosce meos li-
 terarios

terarios labores consecrarem:
qui & eruditione tanta esset, vt
de suscepto instituto recte iudi-
caret; & autoritate tantus, vt
maledicentium vocibus impe-
raret: quorum alterum pergenti
mibi animum daret; alterum,
securitatem: & vt labores mei,
ob virtutē, & sapientiam (cui-
cui nuncuparentur) eidem cul-
tus atq; amoris testimonium ex-
tarent: ita eadem sapientia, &
virtute scripta mea comproba-
ta, ab alijs auidius expeteren-
tur. Si quid nouum, ipso nouita-
tis nomine continuo apud im-
peritos quorum pars longē ma-
xima

Dedicatoria.

5

xima existit, odiosum est: et suspectum habetur; sin veró recté explicatum quid sit, id non illi simplices, sed periti, ad inuidiam rapiunt, rodunt, & liuore insectantur. Ergo tu occurrebas (honoratiss. vir) ex omni nobilitate unus, cui et musa nostra debet istud testimonium: et a quo comprobata studia nostra, (quia tanta sapientia es) & præsentibus, & posteris, per te futura sint gratiora: tuo nomini cedit nouitatis odium: cedit inuidiæ calumnia. Atque ita iam tum ex rumore tantum atq; hominum vocibus de te existima-

A 3 ram.

ram. Cum veró aliundé ex certa relatione accepissem, te haud scripturientium libidinem probare, librum antequam prælo tradatur petere, velle ante cē-
sere: magnum æditum testimoni-
um prudentiæ tuæ, mihi
spem fecit, quod postea coram
sermonibus cognoui, te vnum
esse cuius iudicio permultum
ad scriptorum meorū laudem,
& autoritatem accederet; ut
qui non tantum civilibus causis
atq; reipublicæ negotijs, æqui-
tate, ac iustitia præsis: sed omni
philosophiæ parti successivis ho-
ris aliquid otij impertias: Me-
dicinæ

Dedicatoria.

7

dicinae autem & ad valetudi-
nis curam, & honestum animi
oblectamentum (magnorū Re-
gum atq; Imperatorum exem-
plo, Tiberij, Hadriani, Iustini,
Lysimachi, Gentij) ita studeas
ut huius facultatis scientia, vel
cum ipsius artis professoribus
ferē sis comparandus. Quid te
solum dico (Clarissime Cecili)
literarum scientia, atque omnis
Philosophiae rerūq; multarū
cognitione excellentem? Cuius
familia tota docta est, & in ea
coniunx Græcarum literarum
(ut olim Cornelia Latinarū)
& omnis humanitatis scientia

A 4

cele-

celeberrima, ad honorē, et am-
plitudinem tuam præterquā ex
virtute ac pietate, magnū vitæ
solarium; summum accedit or-
namentum: ut domus Ceciliana
cū ipsis academijs literarū lau-
de cōtēdat. Ecce ergo tibi Me-
dicinæ nostræ incrementū (ho-
noratiss. Domine) quantū id si
requiras, certē omnium morbo-
rum communem, dyscrasie au-
tem, propriam complexū The-
rapeiam. Cum veró dyscrasia
omnis vel ex elementari quali-
tate ametra, vel ex venænata
contaminata oriatur, utramq; a
summis ad infima persequuti
sumus.

sumus. Ex hygieina tenes institutū, quod cum probas (probas autem & autoritate, & iudicio) alacrius pergimus, & in eo toti sumus, quantū per negotia, rei^q familiaris curam liceat, ut vniuersum medicinæ corpus, et ad sanitatē, & ad pulchritudinem omnibus membris conformatum, & excultum, Cecilia-
nis auspicijs in lucē, atq^q hominum conspectum producat.
Quod autem concisis partibus ædimus, haud fabrica tota, dabis occupationibus. Interea dum totum absoluerimus, tibi magni voti reos nosmet habemus.

A 5 mus.

mus. In Therapeutica hac quemadmodum in Hygieina fecimus, a magni nominis autoribus cogimur dissentire; atque adeo in reliquis dissentiemus: dissensionis autem causas Scholijs quas in hac, & in cætera meditamur, aliquando docebimus. Interea leges illæ materiæ, atque formæ artium omnium; veritatis, iustitiæ, sapientiæ, methodi, in eo crimen (si quod commissum sit,) id omne in sese recipient. Proponimus nobis artem secundum illas leges describendam, hanc si minus
nūs

bac
ina
u-
it-
ti-
u-
in
n-
e-
e
,
,
-
-
-
nūs assequimur, saltem se-
quimur, & alijs persequen-
di autores sumus. Mibi
autem vel operis socium
esse satis erit. Superfunt
adhuc morbi conformationis
omnes, & omnium com-
posita Therapeia. Confor-
mationis morbi (certis ob-
structionibus acceptis) ferè
Chirurgici sunt. Expecta-
bis ergo a nobis imposte-
rum (Sapientissime Ceci-
li) Therapeiam Chirur-
gicam, cum illarum ob-
structionum morbis quæ Phy-
sici Remedijs parent, at-
que

atque reliquorum omnium
compositam Therapeiam: In-
terea conatus hosce nostros, &
tanquam solidi corporis um-
bram (ut facis) boni consule.
Addemus aliquando solidita-
tem, nervos, succum, sangui-
nem & colorem. Alij verò
nec ipsi occupati, nec honestè
otiosi (sitantum a seipsis impè-
trare queant) probris ali-
quando abstineant, atque desi-
nant maledicere. Deus Eccle-
siæ suæ, & Reipublicæ An-
glicanæ bono, amplitudinem
tuam in vita tueatur, & labo-
ribus exantlatis, fatoque per-
functum

fu
sea

Dedicatoria. 13

*functum in æternas beatorum
sedes suscipiat.*

*Cantabrigia, ex ædibus meis.
xiiij. Martij, 1582.*

*Amplitudinis tuæ
studiosissimus,
Timotheus Brightus.*



In

*In secundam Medicinæ par-
tem Doctoris Brighti.*

*Nuper adumbratos Medicinæ vidimus artus,
Qualis Apellea pingitur arte Venus:
At deerat pectus, pectus quoque Brighte dedisti,
Cultaque cinnis est Ἰατρικῇ tuis.
Adde pedes reliquis supremâque robor a mēbris,
Principijs, fines; & Dea qualis erit?*

Εἰς ὄνομα ὅ τ' εὐμεθοδικωτάτ' Ἰατρὸς τ' Τιμο-
θέος Βρίχτης τ' ἐστὶ λαμπρὸς δίστιχον.

Οὐτόλε μαφιδίως λάχες ὄνομα: ἐσσί γὰρ αὐτὸς
λαμπρὸν ἐν ἱητροῖς φῶς μεδόλοιο φέρων.

MEDI-



**MEDICINÆ
THERAPEVTICÆ
PARS: DE DYSCRASIA
CORPORIS HVMANI.**

Therapeutica.



THERAPEVTICA
est secūda pars Me-
dicinæ de sanitate
restituenda.

Sanitatis restituo
fit ametriarum
correctione.

Ametria est viti-
um partium sanitatem constituentium.

Ametriæ corriguntur remediis.

Remedium est therapeiæ opus ametri-
am expugnare affectum, Excipe quibus
vires

vires prorsus succumbunt : nec ad integram therapeiæ historiam recreari queant.

His manus abstinenda atque mors ipsa prædicenda.

Signum veró huius imbecillitatis est pulsuum ad asphygmiam præceps declinatio.

Deficiunt autem vires prostratæ duobus modis: vel dissipatæ: vel suffocatæ.

Si vires dissipantur, pulsus declinantes æduntur citra inæqualitatem.

Dissipantur vires dupliciter: vel sensim: vel repenté.

Sensim dissipatæ hanc pulsuum seriem ædunt: Languidum, paruum, rarum, tardum, si nullus æstus subsit; si quis autem sit, crebrum, atque vehementem; deinde myurum reciprocum, reciprocum deficientem, myurum non reciprocum, formicantem, abolitum apparentem, atque tandem veré abolitum.

Sin vero repenté vires deficient, talem pulsuum seriem obtinent: Languidum, paruum, crebrum, celerem, vndosum, vermiculantem, formicantem, abolitum

ap-

apparentem, atq; tandem veré abolitum.

Atque virium dissipatarum pulsus ita habent: suffocata sequentem seriem ostendunt.

Languidum, tardum, rarum, & continuo inæqualem, nunc languidum, nunc vehementem, nunc paruum, nunc magnum, nunc celerem, ilico tardum, crebrum, statim autem rarum: & quo plures sunt magni, vehementes, &c. eo minus vires pressas ostendunt: Vbi autem magis adhuc pressæ suffocantur, intercurrentem, intermittentem in pulsum multitudinem (quoq; intermissio diuturnior, eo periculosior existit. Diuturna autem est quæ duos pulsus excedit. Iuuenibus periculosissima pulsum intermissio: minus pueris: minimè senibus; nec iuuenibus admodum, quibus ea intermissio familiaris. Atque intermissio si diu perseveret, repentina mors expectanda.)

(Intermittenti vicina est quies externa diuturna, in qua pulsus citra inæqualitatem existit: intermittens inæqualitatem obtinet) tum intermittentem in vno pulsu (ex quo genere sunt capricans & di-

B

erotas)

crotus) tum vndosum, vermiculantem, formicantem, (atque si arteria dura est, nec vndosus, nec vermiculans esse queunt) tum myurum in vna distensione recipro- cum, tum non reciprocum, vltimo defi- cientem, non reciprocum.

Pulsus omnes hii, si ordinati etiam sint, certissimum discrimen minantur.

Atque hæc virium desperatarum signa sunt: atque Anomalie communis.

Remedii partes sunt duę: Agendi vis contraria: atque huius recta committen- di ratio.

Agendi vis contraria ex duobus confi- sit: Ex qualitate contraria: Et copię; siue quantitatis paritate.

Agendi vis contraria duplex existit: Homoiomera, vel Anomoiomera.

Homoiomera est item duplex: Phy- ca, vel Chirurgica.

Phyfica est quę naturę viribus infer- tur.

Phyfica est vel Diætetica: vel Pharma- ceutica.

Diætetica est, quę ex diætā petitur.

Phar-

Pharmaceutica est, quæ pharmaco infertur.

Pharmacum est natura, extra dietam posita.

Pharmacum ad partes internas, qualitatem deleteriam haud obtineat; & ad omnes partes quibus debetur, quantum eius natura ferat, esto sympatheticum: ad viscera autem adhibitum, roborans; & astrictiōis particeps, maximè ventriculo laborante.

Porro consistentiam habeat proprias vires tuentem, quoad partis affectæ conformatio id ferat: & quàm fieri potest gratum id esto, vel saltem haud vehementer ingratum. Medendo autem, in eodem genere, per varia pharmaca eugari licet; atque quod maximè conuenire compertum est, id sedulo vsurpandum.

Pharmacum est duplex; Naturale vel Artificiale.

Naturale est tale, quale naturâ æditur vsurpatum: vt lactuca, bolus armena, rosa, &c.

Artificiale, est arte confectum, vt syru-

pus, Emplastrum, Cataplasma, &c.

Hactenus vis Physica.

Chirurgica est, quæ manus operâ fit, vel instrumento chirurgico: vt trepano, glossocomio, nouacula, &c.

Vis homoiomera ita habet: sequitur Anomoiomera.

Anomoiomera, est ex homoiomeris inter se mistis.

Anomoiomera est duplex: vel ex physica mista physicis: vel physica chirurgica.

Physica physicis, vt diætâ & pharmaco.

Physica mista chirurgica, est vel alterutra principi, vel subsidiaria.

Physica mista chirurgica, est porro duplex: Alterutra Physica, vel vtraque.

Hactenus qualitas contraria; sequitur quantitatis paritas.

Quantitas par, est ametriæ vehementiæ æqualis.

Vehementia percipitur ex symptomatum magnitudine: hæc autem, ex ipsis cum pristinis actionibus, operibus, &

cor-

corporis qualitatibus comparatis.

Atque hîc, morbus corpori, vel corporis parti valde dissentiens, remedii vim eo fortiorē postulat, & quantitate auctiorē.

Vis contraria ita se habet: sequitur recta committendi ratio.

Recta committendi ratio in duobus consistit: in aditus commodi delectu: & virium dosi.

Aditus commodus est in aetiam directus: qui nisi naturâ detur, neque res aliter expediri queat, arte paretur, siue pharmaco, siue instrumento Chirurgico.

Aditus si longus sit, medicamento consistentia eo liquidior esto: atque si opus est, adiunctum habeat vehiculum, naturæ tenuitate præditum: vt vinum, acetum. &c.

Aditus autem in partes naturâ directi, tales sunt in cerebrum, sinciput, coronalis futura,, aures, nares.

In Pulmones, latera, interna, & thoracem: Ore spiritu hausta, vel sensim lambendo deglutita.

In ventriculum, Iecur, lienem, ad motæ

é regione, & in ventrem sumpta.

In renes : extrinsecus adhibita, sumpta, & subdita per sedem.

In intestina superna, os, inferna, sedes.

In vesicam, & vterum: é regione applicata, assumpta, immissa.

Aditus delectus talis esto : sequitur Dosis.

Dosis est quantum semel ægrotus, vel pars ægrota applicari sustineat : siue loco : siue viribus : siue quod molestum est.

Hic curationis atque creationis ametriarum, paria tempora sunt, nisi admodum leues eę sint: tum namque cito tolli poterunt.

Dosis duplex est: Conferta, vel partita.

Conferta dosis omnem ametriam, vel maximam eius partem tollit : Estque ametrię acutę, & virium robustarum.

Partita dosis, partem tantum ametrię tollit : estque ametriarum, viriumque contrario sese modo habentium : atque initio maior dosis, atque validior esto: Et prior dosis, vbi partes suas egerit, altera applicanda; eaque toties repetenda dum

tota

Tota ametria euanuerit.

Hæc de Dasi.

Ametriæ, si vel sede, vel naturâ obscure sint, primum explorandæ.

Sedes ex propria functione læsa deprehenditur.

Ametriæ natura ex functionis specie læsa, & huius lædendi ratione. Hæc tamen si adhuc obscura est, res permittenda naturæ, quæ recta diæta adhibita rem proder tandem: sin minus; ad experientiam aut analogismum est perfugiendum.

Ametria, est vel simplex: vel composita.

Simplex ametria, simplici remedio expugnari poterit.

Ametria simplex duas obtinet species: Solitariam: vel causis fota.

Solitaria ametria, remedio solitario est expugnanda.

Causis fota remediū postulat & has fouentes extirpans: atque in fotis, a causis fouentibus extirpandis therapieæ initium esto, & qua sese intulerint seriæ (si plures eę sint,) eadem auferantur: Excipe si quid grauius vrgeat; tum huic prorsus (ceteris interea haud neglectis) studendū

Urget autem grauissimè primùm, quod ægrotum in maximum vitæ discrimen perducit: cuiusmodi est virium iactura & harum labentium causæ: vt vigiliæ: functio præstans læsa. Tum de quo maximè ægrotus quæritur: vt dolor, æstus, &c.

Ametriarum autores expugnandæ, sunt vel primæ: vel a primis.

Primæ, aliarum autores existunt. Atque hæ primo quoquo tempore sunt auferendæ.

Prima causa est vel diætæ error; vel temerè corpori irruens.

A primis sunt internæ, atque corpori inhærentes. Hæ, quatenus ametriarum autores sunt, eatenus emendandæ, viribus ægroti prospectis, & minima molestia.

A primis sunt vel opera praua: vel temerè irruentium partes, & reliquæ corpori inhærentes: vt spicula, ramenta, &c. Opera praua sunt vel ratione tantum: vel toto genere.

Ratione tantum praua sunt vel qualitate, vel quantitate, vel vtraque.

Qualitate praua, secundum hanc ipsam
fam

ſam ſunt emendanda.

Qualitate praua ſunt vel elementari talia, vel venenata.

Elementari praua ſunt elementaribus corrigenda.

Sunt autem praua vel primis qualitatibus: vel a primis ortis,

Primis.	Calido.	Calida, frigidis	ſunt corrigenda: vt	Viola, Roſis &c.
	Frigido.	Frigida, calidis		Chamamelo, &c.
	Humido.	Humida, ſiccis		Brasicca, Beta &c.
	Sicco.	Sicca, humidis		Bugloſſa, Malua &c.

A primis peccant tenuitate, craſſitie, duritie, lentore, acrimonia.

Tenue, increaſſantibus corrigatur: cuiuſmodi ſunt frigida, vel temperata, citra acrimoniam: vt lactuca, amyllum, tragantha, &c. Craſſum attenuantibus, cuiuſmodi ſunt ſecundo, aut tertio reſeſſu calida, vel frigida tenuis materiæ: Calida, vt apium, feniculum, petroſelinum; Frigida: acetum, ſuccus aranciorum, linionum, &c. Durum molliatur ex naturis moderaté, nec ſupra ſecundum gradum calidis, & humore aereo refertis: vt oleo maturo adipe temperati animalis malua.

A 5

Lentum

Lentum tergeatur ficcis naturis mediæ substantiæ, cuiusmodi detergentia fere amara sunt omnia, vel salsa, siue frigida, siue calida. Frigida, vt cichorium, omne intybi genus, &c. Calida, absinthium, aristolochia, centaureum, &c.

Acre mitigetur frigidis mediæ substantiæ, & austeritate præditis: vel aciditatis: vt ribibus, oxyacanthæ succo, maligranati succo, &c.

*Elementaris vitij emendatio ita habet;
sequitur venenati correctio.*

Venenata qualitas alexiteriis, & alexiphar-
macis est corrigenda: vt succo mali
punici, medici, citrei, dictamno, scor-
dio, gentiana, &c.

*Atque opera qualitate peccantia ita cor-
rigenda.*

Quantitate peccantia, eadem fere
aucta tantum peccant: excepto sangui-
ne qui etiam defectu peccare queat.

Sanguinis autem defectus cibis eu-
chymis, iusculis, vini potione, moderata
exercitatione, & hilaritate reparandus,

Redun-

Redundantia est vel succorū, vel excrementorum,

Succorum vniuersalis est.

Hæc valde laceffens, quo tempore natura contra insurgit quod vigore ametriæ fit, minime tentanda; sed naturæ permittenda, nisi imperfectè mouerit, tum namque eius conatibus est succurrendū.

Excipe cum præceps admodum redūdantia sit, tum minimè cunctandum, neque naturæ motus expectandus, sed ipso initio redundantia vis frenanda.

In ipso naturæ congressu, & sūmo certamine, quæ crisis dicitur, vehementissime corpus turbari solet, & egrotus multo peius sibi videtur habere: pulsus inæquales, delirium, vigiliæ inquietudo, difficultas anhelitus, difficilis sensus, &c. inuadunt, & inopina actionum multarum deprauatio: quæ tamen ipso vigore concoctionis signis apparentibus, terroris plus habent quàm periculi.

Hanc naturæ luctā excretio manifesta, vel abscessus solent excipere: sine quibus virium imbecillitas, causæ vim lethalem monstrat.

Excretionis autē futuræ, rigor præcedēs repen-

repentinus, argumentum est.

Excretio si vomitu futura est, præcedit oris ventriculi morsus, capitis dolor vertiginosus, & tenebrosa oculis obuersantia, saliuæ multa, & iam ad fores vomitu, labri inferioris tremor, & agitatio.

Sin autem sudore, (vrina, atque aluo, & rigore suppressis) calidus vapor repente exhalas, pulsu interea vndoso, atq; molli.

Sin vero nec vomitus, nec sudores succedant, aluus soluta expectanda.

A crisi verò, si ægrotus melius sese habet, vrinis tamen nec multis, nec copiosam hypostasim habentibus, nec morbo sensim declinante, abscessus expectandus.

Fit autem abscessus vel in partes superiores, vel in inferiores.

Abscessum in partibus superioribus futurum spirandi difficultas incipiens; mox autem desinens, argumentum est.

Circum caput autem fieri, huius dolor, grauitas, sopor, surditas, argumenta sunt.

Sin autem horum nihil apparuerit, sed grauitas, dolor, tensio, vel inflammatio circa internas corporis partes apparuerint, partibus imis abscessus expectandi.

Mouere

Mouere autem criticé solet natura, di-
erum quaternionibus: Validissimé & op-
timis ægroti rebus in eo quaternione, qui
ab antecedente quarto numeratus septi-
mum attingit: præsertim tum amētria in
vigore existente: Atque tum quarti veli-
tatio, talis namque huius motus est ante
septimum, illius index est, & coctionis
signa manifesta præbet.

Quaternionis certis periodis cōtinētur.

Periodus est tempus sex quaternionū.

Periodi primus atque tertius quater-
nio, perfecti sunt: reliqui, imperfecti; &
ex præcedenti sumentes originem.

Periodi partes sunt duæ.

Prima pars est a primo quaternione ad
quartum.

Secunda est a quarto ad sextum.

Prima pars in duo membra diffunditur:
prima pars intra primum quaternionem:
secunda, intra secundum.

Periodi secunda pars, duo item mem-
bra habet: prima pars est intra secundum
& quartum quaternionem: secunda est
intra quartum quaternionem & sextum.

Periodorum duæ sunt species:

Prima

Prima est ad diem vigesimum.

Secunda est a vigesima ad quadragessimam.

Prima periodo mota natura quaternionibus, acutissime stimuletur: idque dupliciter.

Peracutē: vel Remissius.

Peracutē dupliciter: Exquisitē, vel haud ita.

Exquisitē intra primum quaternionē.

Haud exquisitē intra secundum quaternionem.

Remissius stimuletur duos gradus obtinet
Primo gradu stimuletur inter secundum & quartum quaternionem.

Secundo gradu inter quartū & sextū.

Primæ periodi index optimus est undecimus, decimus septimus, ultimo quartus.

Critici optimi sunt: primum septimus, tum decimus quartus: Ultimo vigesimus.

Secunda periodo, lente admodum stimuletur indicat natura.

Huius vero quaterniones sunt: 24. 27
31. 34. 37. 40.

Huius ordinis anomalia oritur ex humoris

THERAPEUTICA. 31

moris accessibus: & vehemētia. Atque tū
naturę motus in alios dies confertur: nisi
accessus dies cum quaternione conspiret.

Hic crises fiunt difficiliiores: præser-
tim si alio atque statim accessus die con-
tingant.

Accessus fiunt, vel diebus paribus, vel
imparibus.

Pares dies extra consuetū naturę mo-
tum sunt 6. (cuius hic index quartus esse
poterit.) 8. 10. 12. 16. 18. 28. 30.

Inter pares dies 18. saluberrimę fiunt
crises: Infæliciter autem hac serie. 6. 8.
10. 12. 16.

Impares dies sunt. 3. 5. 9. (qui & inter-
calares nominantur) 13. 19. 21.

Ex imparibus fælicissimi sunt. 9. 5. 3.

Infælicissimus. 19. minus 13.

Hæc de Criticis.

Vniuersalis redundantia, ex fontibus
hauriatur: per initia: quo tempore melius
se habet ægrotus: Copiosę, præsertim
pruriente, turgenteque materia.

Attamē in raris, macilētis, valde obesis,
ætate tenella, tēperamentis, calidis & hu-
midis,

midis, prægnantibus præsertim octauo aut nono mense tempestate digerente, vel nimium corpus densante, res temperanda.

Vniuersalis plenitudo est æquabilis: vel inæquabilis.

Æquabilis plenitudo (natura meatibus conferente) vndelibet vacuari poterit.

Inæquabilis vacuetur ex parte dissitissima ei, in quam inæquabiliter redundat.

Inæquabilis est vel mouens: vel quieta.

Mouens ipsius motus initio refrænetur.

Quieta est vel libera: vel impacta.

Libera, a parte vicina est vacuanda: atque talis vacuatio deriuatio dicitur.

Si impacta sit, eodem loci est liberanda.

Vniuersalis redundantia duplex est: plethora: vel cacochymia.

Plethora est vniuersalis redundantia sanguinis.

Plethoram (vbi a metriam committit) paribus diebus natura vacuare solet: idque naribus, vel menstruis, vel hemorrhoidibus.

Si nares affectat, oculis splendores obuersantur: hebetescunt, lachrymantur: rubent:

bent:

bent : malæ rubicundæ fiunt, & nares rubræ : hypochondria tenduntur absque dolore, spirandi difficultas premit, Caput dolor distendens, atque pulsans afficit : & iam fluxu in procinctu, narium pruritus.

Menstruis fluxuris præcedit lumborum tensio, grauitas, dolor, in mulieribus præsertim si alius nulla signa dederit : & consueto tempore menstruo, hæc fiant.

Si loca circum anum tumuerint cum dolore, neque alia signa sese prodiderint, & certis temporibus consuetæ sint, hæmorrhoides expectandæ.

Sanguini deplendo commodissimum tempus (si optio datur) Luna in Ariete, Sagittario, Cancro, Libra, Scorpione, Aquario, Piscibus : nisi si Luna in aliquo signorum parti dominetur, vt in Ariete, Capiti : Tauro, ceruicibus : Geminis, humeris & brachiis : Cancro pectori, stomacho, costis : Leone cordi, atque dorso : Virgine ventri, atque intestinis : Libra, renibus, vmbilici regioni, atque nartibus : Scorpione, pudendis : Sagittario, femoribus : Capricorno, genibus : Aquario,

his facile erumpit : Lassitudo tensiva premit , atque ægré corpus , & artus præ pondere mouentur : manus in pugnum haud facile adducitur : respiratio difficillior , atque crebrior , præsertim ab exercitatione , atque si redundantia sanguinis ametriam commiserit , eiusmodi signa præcesserunt.

Cum sanguis ad vasa redundat , copiose profundi poterit , & quantum vires ferant ; fortasse nostratibus mediocri mensura , ab 3. 6. ad 3. 10 : Maxima , ab 3. 12. ad 18.

Ad vires plethora est , ubi vires premantur. Hic corpus , & artus ingrauescunt , & motus pigrior euadit. Somnus grauis est , profundus , & interturbatus. Laboras per insomnia grauitè premi se , aut onus gestare , aut loco moueri se non posse putat : atque hæc omnia ne venis plenis , neque distentis ametriam ex eiusmodi plethora commissam præcedunt. In hac , sanguinis vacuatio parcior esto : atque dum plenitudinis metus cesset , finatur fluere.

Si sanguis inæquabiliter redundans ,

mobilis sit, atque iam mouens: (secta prius basilica) alia distantissima secetur: rectitudine venarum semper obseruata: foramine exiguo, nisi præceps fluxus sit, & parti nobili minetur. Tum namque ampla vena, loco finitimo secetur. Atque vbi ob virium imbecillitatem, partita missio vsui fuerit, eodem die, festinanter iteranda vacuatio.

Reuellit autem vena humeraria a partibus supra claues: Celerius in cubito; tardius in ramo inter pollicem, & indicem. Interior vena reuellit a partibus intra claues, & renes: tardius in vena inter annularem, & minimum digitum.

Vna media ex vtrisque reuellit.

Poplitis vena reuellit ex partibus subter renes: lentius secta malleoli vena.

Renes ancipites sunt.

Atque sanguinis reuulsio, phlebotomia ita habet.

A capite veró deriuant scapularum atque humerorum scarificatus: iniectæ cucurbitulæ; sanguinis fluxus é naribus, arteriæ pone aures: sectæ iugulares.

Prio-

Priores capitis partes, frontis vena deriuat: Posteriores, cucurbitule ceruici iniectæ, atque humeris: vel incisa puppis vena.

Oculos, venæ in alterutrum angulum latæ.

Aures, vena sub aure.

Os, ea quæ sub labiis.

Fauces, quæ sub lingua.

Pulmonem, interior cubiti sinistri vena: eademque a corde deriuat.

A thorace, interior vena cubiti, lateris eiusdem.

A Iecore, interior dextera.

A liene, interior sinistra.

Ab vtero, vena poplitis,

Atque sanguinis derivatio ita fit.

Si impactus sanguis fit, primum in pus immutatus, eodem loci vacuetur: suppurato (nisi sponte fiat) vel ferro, vel igni, vel medicamento rupto: vel diaphoretica exsucto. In pus autem mutabitur modicé, atque temperaté calidis applicatis, & humidis emplasticis: vt pulve ex farina triticea, addito butyro, atque o-

ui vitello, &c.

Sanguine in pus conuerso siue scalprum, siue cauterium, siue pharmacum causticum, ei parti applicetur, quæ mollior digito cedit, magis acuminatur, & qua commodius sanies effluat.

Si scalpro res transigenda, & pars pro libidine conuerti nequit, etiam aduersa parte vulnus inferendum: Vulnus simplex aliquando sufficit parte decliui, duplici aliquando, & trigono opus est.

Si cauterio vtendum, ex subere, mollioribus corporibus conueniet: Ex metallicis, aurum est clementissimum.

Ferro, vel igni vtendo, vasa insignia, neruus, tendo, vinculum, vel neruosum quid, cuiusmodi est latus tendo, cauenda: nec vnquam articulus vrendus. Ergo cutis cui eiusmodi subiecta sunt, prius est apprehendenda, ne subiecta conuulnerentur.

Cum in profundo sanies resederit in musculis, fibrarum interstitia cultello ligneo, vel digito diducenda, ne fibræ præcidantur: Et locis quibus plurimè occurrunt

currunt arteriæ, paruo vulnere contentus sis.

Porro partes acuti sensus nec ferrum, nec ignem sustinet; præsertim autem oculi cauteria refugiunt.

In occipitio, temporibus, & vbicunque caluaria mollior est, & vbi vel exitus neruorum, vel aditus vasorum est, cauteria periculosa.

Exteriore humeri parte tendo, ignem, ferrumue haud sustinet.

In cranii fracturis, vbi modiolis, cycliscis, terebellis via puri fit: a futuris, neruorum radicibus, molliori osse, ferrum declinandum.

Vbi ad colli latera apperiendum: a carotide arteria, vena sphagitide, neruo vocali abstinendum.

In empyicis, & deploratis pleuriticis, scalprum, vel cauterium, inferiore parte mesopleuri collocandum.

In extremis ilibus, tendines, atque vasorum coitus cauendi: item quod in podice neruaceum, & partes genitales: Imprimis autem nerui (maximè qui sub natibus) ne nudati frigore vio-

lenter prouidendum.

Rectum autem, transuersum, vel obliquum, an vulnus esse debeat, partis figura, flexus, rugæ, fibræ, indicant.

In collo, qua parte progrediuntur vena, arteria, neruus, rectum magis quam aduersum adigatur: alioqui melius transuersum.

In fronte é rugis transuersum sit, nec ita profundum.

In inguinibus, é flexu transuerso ducitur, duplex interim, angustû, & in myrti folium oblongum.

In ventre, nisi prohibeant flexus secundum fibras musculorum, vt etiam in reliquis.

Atque si vel ferro, vel igni opus est; ita res transigenda.

Sin veró patiens mollis vtrumque refugiat, caustico, vel septicò pharmaco res expedienda: a quibus minus doloris percipitur, si pars ante laxante remedio foueatur. Ab eis autem applicatis continuo folium ex lenientibus superponendum, vel splenium epicerastico illitum.

Sin

Sin veró dolor ingens ex pharmaco
oriatur, statim eodem reuulso, dolor le-
niendus, & mitius agendum.

Ruptoria autem eadem quantitate ap-
plicentur, qua vulneris magnitudinem
esse cupis.

Petantur ruptoria ex naturis summo
excessu calidis, vel naturæ proprietate
talibus: vt Theriaca, vrticę semen, é vino
tritum: Caulium radices vstæ, tritę, &
axungia vetere exceptę. arsenicum mer-
curius sublimatus, quibus habita ratione
corporum, & vomicarum prudenter v-
tendum: excipiantur autem butyro, ax-
ungia, terebinthina, visco, &c.

Haftenus Plethora: sequitur Cacochymia.

Cacochymia est redundantia ex alio
humore quám ex sanguine.

Cacochymia est pharmaco catharti-
co expurganda.

In cacochymia purganda minus viri-
um requiritur, quám in sanguinis missi-
one.

Cacochymia purgatur pharmaco, vel
vomitorio: vel deiectorio. Pharmaco

vomitorio: vt seminibus raphani, a ʒ.iii. ad ʒ.ʒ. puluere radicū afari a ʒ.ʒ. ad ʒ.iiii. Hellebori albi fibris rapano transfixo maceratis, a ʒ.i. ad ʒ.ii. arboris iuglandis iulis a ʒ.ʒ. ad ʒ.i. &c.

Vomitoriū esto mellitū & haustu liquoris satis largo ebibitū, & calore tepidum.

Vomitorium autem imperetur materia ad stomachum obrepente, & ægroto ad vomendum apto. Eo perreptare solet humor æstate.

Ad vomendum autem apti sunt, quibus nec pressum, nec angustum pectus, nec ceruix gracilis, aut oblonga, nec tabidi sunt, nec asthmatici, neque præcordiorum dolore laborant.

Vomiturus si ægré vomat, cibum pressumat, & post cibum pharmacum vomitorium.

Post haustum pharmacum corpus agitatione atq; motu turbet: & vbi nausea vrget, prono se situ collocet, firmato capite, & ventriculo manu circūacta: & vomitorii impetu sedato, aceto odorato, vel suaueolente grato recreetur.

Eiecore, aut liene cursus in aluum, vomiti-

mitione reuellit. *Atque vomitus ita instituatur.*

Purgando autem humor noxius, nunquam in affectam sedem est deriuandus.

Circa ventrem imum extenuatis, macilentis, acuto sensu præditis, vehementer purgationes cauendæ.

Purgandus, loco temperato cõtineatur.

Pharmaco deiectorio (si optio datur) aptissimum tempus, Luna in Geminis: in Cancro: in Scorpione: in Piscibus: Hora veró commodissima matutina.

Ante pharmacum, (si dura sit aluus) clyster iniiciatur molliens. Austrino statu felices succedunt purgationes.

Vbi incognita sit laborantis natura, blando pharmaco sensim exploranda.

Cacochymia interdum præparationem postulat: Ergo vbi ametria accelerare haud postulat: quod crassitie impedit, incidendum atq; tenuandum. Quod lentum tergendum: quod acre, atq; feruens mitigandum: deniq; pori, atq; meatus laxandi: circum viscera fots adhibendi: & corpus fluidum habendum.

Quibus deiectorio purgadis, vetriculus imbe-

imbecillior, nauseabundus existit, pharmacum consistentia solidum esto.

Vbi pharmaco valido opus est, detur ieiuno: ventriculo tamen adhuc ciborum reliquiis madente.

Sin pharmacum imbecillius sit: purum inueniat ventriculum.

Si cui consueta est matutina vomitio, ea ante sumptum pharmacum cienda.

Hauſto medicamento, vel aqua hordei, vel succo punici, vel vino austero, vel saccharo, reliquæ, faucibus, & gulæ sunt deiiciendæ: præsertim si sapor ingratuſ offendat.

Corpus autem post surrectum, semihoræ spatio in quiete tenendum.

Si post sumptum pharmacum, inexpugnabilis somnus sit, vtile foret medicamento indormire: cum autem purgare cæperit, dum compleuerit est vigilandum.

Cùm prorsus é ventriculo exierit, vt nullus eius nec odor, nec sapor, nec ructus, aut nausea, aut erosio subſit, cibus offerri poterit: excidit autem ventriculo quatuor post horis; Cibus veró offerendus

phar-
letur
rum
pu-
tio,
or-
ro,
ulæ
ra-
ni-
x-
li-
a-
n-
vt
i-
s
o
-
s

duſ eſto ſorbitio detergens. Vomitionem deiectione reuellit.

Cacochymia eſt vel ſimplex : vel compoſita.

Simplex eſt, cū vnus aliquis humor præter ſanguinem redundat.

Cacochymia ſimplex, eſt vel ex calido humore vel frigido. Calido ex bile.

Bilis redundantis ſigna ſunt: faciei, oculorum, atque totius corporis color pallidus, flauus, aut citrinus, & ictericus, Vrina flammea, acris, & pauci ſedimenti: vigiliæ, vel ſomni leues.

Bilem natura ſolet imparibus diebus excernere.

Bilis, ſi acris ſit, ante purgationē, epiceſticis eſt mitiganda. Purganda autē colaphygiſ: vt ex naturalibus, rabarbaro per ſe a ʒ.i.ß. ad ʒ.ii. diluto, ad ʒ.iii. Dachrydio a granis ʒ. ad ʒ.ii. Caſſia a ʒ.ß. ad ʒ.i.ß. Manna ab ʒ.i. ad ʒ.iii. Oxyphænice, ab ʒ.i. ad ʒ.iii. vel iiii. Aloe, a ʒ.i. ad ʒ.ii. Ex artificialib. Syrupo roſaceo, ab ʒ.ii. ad ʒ.4. Diapruno ſimplici, ab ʒ.i. ad ʒ.i.ß. Cōpoſito a ʒ.iii. ad ʒ.v. vel vi. Electuario de ſucco roſarum a ʒ.ii. ad ʒ.v. Pilullis Afai-
eret,

eret, & de Fumaria, a ℥.ii. ad ℥.i.℞.

Atque ita bilis expurganda.

Frigidi humores interdum sunt incendiendi, attenuandi, detergendi antequam expurgentur.

Frigidos humores paribus diebus natura solet excernere, & si superent secundam periodum, fere abscessibus sese exponere.

Frigidi humores sunt vel Pituita, vel Melancholia.

Pituitæ redundantis signa sunt:

Faciei atque corporis color albicans, interdum liuidus ac plumbeus, moles corporis ampla, & obesa, mollis, contactu frigida: Vrina pallida, alba, nunc tenuis, nunc crassa cum multo sedimento. Somnus profundus. Atque hæc omnia pariter aquosi humoris signa esse poterunt.

Pituita phlegmaphygis est expellenda: vt ex naturalibus Agarico trito a ℥.i. ad ℥.ii. infuso: a ℥.ii. ad ℥.iii. vel. v. Colocynthide a ℥.℞. ad ℥.ii. Turbit, a ℥.i. ad ℥.i.℞.

i.ß. Lathyride, a granis 4. ad 7. vel 8. Euphorbio annotino, a granis 6. ad 12. Tithymallorum foliis torrefactis, a ʒ.ii. ad ʒ.i.

Ex artificialibus, hiera pichra Galleni putata, a ʒ.iii. ad ʒ.v. electuarii forma: in puluere autem a ʒ.ii. ad ʒ.ß. Hierarchigenis, a ʒ.i. ad ʒ.ii. Pilulis mastichinis, de tērbith, stomachicis, &c. a ʒ.i. ad ʒ.i.ß.

Atque pituita ita expurganda, sequitur Melancholia.

Huius redundantis signa sunt: faciei, atque totius corporis color fuscus, obscurus aut nigricans: interdum vniuersus, & æquabilis, interdum, maculis quibusdam inuistis. Vrina tenuis, alba: atq; si quid melancholiæ excernitur, crassa, atque atra, liuida, aut virescens. Somnus turbulentus, & horrendis insomniis turbatus.

Melancholia maiorem incisionem, quàm pituita postulat, & melanophygis est exigenda: vt ex Natura æditis: Helleboro nigro a ʒ.ii. ad ʒ.i. Sena
in

in puluere, ʒ.i. decocto, ʒ.ʒ. vel ʒ. v. Poly-
podio, a ʒ.ii. ad ʒ.vi. maceratis, decoctis,
& expressis. Epithimo, a ʒ.ii. ad ʒ.ʒ. vel
ʒ.vi. Lapide armenio loto ʒ.i. vel ʒ.ii. non
loto a ʒ.ʒ. ad ʒ.i.ʒ. Lapide Cyaneo, paulo
minore quantitate. Ex Artificialibus,
Diasenna Nicolai, ab ʒ.ʒ. ad ʒ.vi. &c.

*Hactenus simplex Cacochymia, sequitur
composita.*

Composita Cacochymia est, cum va-
rii humores redundant: atque tum signa
æduntur composita.

Composita cacochymia potissimum
artificialia postulat.

Composita duplex est: vel cum ali-
qui humores: vel cum omnes redun-
dant.

Cum aliqui tantum redundant: fit re-
dundantia ex bile, cum pituita, vel bile
cum melancholia, vel pituita cum me-
lancholia.

Bilis cum pituita, redundans, vacuan-
da Diaphænicone, Indo maiore: Bene-
dicta. a ʒ.iii. ad ʒ.v. Diaenico ab ʒ.ʒ. ad ʒ.
vi. pilullis aggregatiuis, maioribus, sine
quibus,

quibus, Coccūs, a \mathfrak{z} .ii. ad \mathfrak{z} .i.
Bilis, cum melancholia redundans,
expurganda electuario de psyllio, a \mathfrak{z} .vi.
ad \mathfrak{z} .i. &c.

Pituita cum melancholia, Diasenna
Rasis ab \mathfrak{z} . β . ad \mathfrak{z} .vi. Pilulis indis: Haly a
 \mathfrak{z} .ii. ad \mathfrak{z} .i. vel \mathfrak{z} .i. β .

Vbi omnes humores redundant, phar-
maco catholico opus est: vt catholico
ipso, ab \mathfrak{z} .i. ad \mathfrak{z} .i. β . Cōfectione Hamech
ab \mathfrak{z} . β . ad \mathfrak{z} .6. Hiera Logadiō, a \mathfrak{z} .i. ad \mathfrak{z} .ii.
Plenitudo autem cacochymica, si in-
æquabilis sit, primum reuellenda purga-
tione (si mobilis ea sit) & astringentibus
repellenda.

Excipe cum venenatum quid sit, vel
si in adenēs, aut emunctoria fluxus fiat:
vel cum metus sit regurgitationis in par-
tem nobilem: tum namque foras rapien-
da.

Sin quieta sit, atque libera, vicinus lo-
cus sumatur, præmissa vniuersali purga-
tione.

Sin impacta sit (quod crassæ pitui-
tæ, & melancholiæ proprium est)
locus scarificandus, cucurbitulæque

D

affli-

affligendæ, & hirudines applicandæ:
Vel pharmaco digerente, atque discuti-
enter res transfigenda.

*Hactenus redundantia; vel Plethorica
vel Cacochymica: sequitur utriusque (&
Plethora, & Cacochymia) particeps.*

Redundantia utriusque particeps sig-
na edit utrique propria: atque tam phle-
botomiam, quam purgationem postulat:
semper a phlebotomia initio vacuationis
sumpto: atque quo sanguis impurior, eo
sanguinis vacuatio parcior esto, si humor
rodens, & acris, ventriculum infestet: hic
prius expurgandus, atque tum sanguis
mittendus.

Biliosam plethoram imparibus diebus
Natura mouet.

Biliosa, ex dextra hauriatur: atque tur-
tissimè vena secta tollitur, & sectionem
exilem postulat.

Pituitosam plenitudinem, & melan-
cholicam, paribus natura mouet: & nisi
bilis mixtæ quid habeant vel multitudine,
& copia, valde lacescant, reliquæ abscef-
sibus purgantur.

Me-

Melancholica plethora, secundum biliosam tutissimè vena secta tollitur & amplam sectionem postulat. Pituitosa verò minimè tuto tollitur, atque parcam admodum vacuationem admittit.

Plethora cacochymica laborantibus (quoniam ferè vires his infirmæ sint) phlebotomia ex modicis interuallis partienda, vel vinculo dissoluto, vel vulnere digito indito, dum vires restaurantur: & si dum vacuas, vires deficient (quod ex pulsu percipietur) & si quid superuacui restet, cessandum. Interdum hora vna, interdum pluribus ad virium restaurationem opus est. Optimum haud vltra diem differre: atque bis die (si vires sinant) mittere conuenit, potius quàm in sequentem differre. Sin autem vires ita infirmæ sint, vt sanguinis missionem haud omnino ferant: boni succi cibis reparandæ primum, ac tum vacuandum. Vbi verò iterare phlebotomiam conuenit, in re-ctum sectio fiat.

Phlebotomiæ vicem supplere poterunt cucurbitulæ cruentæ, vel hiru-dines, vbi vires phlebotomiam recu-

saht. *Hactenus redundantia succorum; sequi-
tur Excrementorum.*

Excrementorum redundantia, parti-
cularis tantum est.

(Hæc ex parte tantum est vacuanda.)

Excrementum redundat, vel in pro-
pria sede: vel in aliena.

Est item vel ubi publicum excremen-
tum redundat: vel priuatum.

Redundantia publici excrementi, est
vel ex chylotico excremento: vel chymi-
co.

Chyloticum excrementum est ecco-
proticis vacuandum: vt aloe, a ʒ.i. ad ʒ.
ii. terebinthina a ʒ.ii. ad ʒ.ʒ. maluæ, be-
tæ, brassicæ decocto, &c. atque hæc
paulo ante cibum, vel cum ipso sumi po-
terunt.

Redundantia chymici, est vel ex pri-
mario chymo: vel secundario.

Primarii, est feri vel bilis, vel me-
lancholię. Serum, diureticis est secernen-
dum: vt apio, fæniculo, petroselino ex
naturalibus. Ex artificialibus, Lithonthy-
bo,

bo, vel puluere Iustini a ℥.ii. ad ℥.ii. Oxymelite diuretico ab ℥.ii. ad ℥.iiii.

Bilis hanc detergentibus & aperientibus hepaticis est eluenda: vt gramine, intyborum generibus, asparago, lupulis, chamædry, &c.

Melancholia, splenicis deobstruentibus, vt cassutha, scolopendria, corticibus tamarisci, & radicum capparum, &c. Atque nisi tergentia hæc rem expedierint, a pharmacis cathartici auxili-um est petendum.

Hactenus primarij excrementi redun-
dantia; sequitur secundarij.

Secundaria sunt ex succis secundariis: Sunt autem vel sudores, vel insensilis perspiratio.

Sudores diaphoreticis moueantur: vt ligno sancto, radice farse parillæ, radice chynæ, &c. ab ℥.vi. decocti, ad ℥.x. vel amplius pro viribus patientis.

Insensilis perspiratio, frictionibus

discutienda.

*Haftenus redundantia excrementorum
ex publica nutrimenti materia; sequitur
ex priuata.*

Primum Cerebri excrementa, quæ vel
errhinis, vel apophlegmatismis, vel ster-
nutatoriis, vel gargarismatis sunt expur-
ganda.

Errhina sunt vel illinenda, vel inspiran-
da, vel inferenda, ex cyclamine, cucume-
re agresti, scāmonio, colocynthide, &c.

Apophlegmatismata ad masticandum
petantur ex radice pyrethri, oxymelite
macerata. Ad gargarizandum, ex deco-
cto glycirrhizæ, pyrethri, saluiæ, betoni-
cæ &c. adiecto cathartici conuenienti: vt
diaphænicone, &c. Ad illinendum pe-
tantur ex aceto, sinapi, melle, &c.

Sternutatoria ex hellebori albi, vel
euphorbii puluere perexigua quantitate.

Pulmonis excrementa sunt becicis e-
lidenda, vt loch sano, depnio, loch de
squilla, &c.

Ventriculi, vomitu eiicienda materia
prius, vt prædictum est, præparata: atque
hic

hic vomitoria poterunt esse faciliora quam in cacochymia: ut raphanis ex oxymelite, a triplicis decocto, mulsæ potione, &c.

Intestinatorum, clysteriis ex decocto conuenienti molliente atque detergente: adultioribus, a li. i. ad li. ii. duplo cathartico quam ore acceptum (si opus est) admisto: olei ℥. iii. vel iiii. adiectis: nisi vel vermibus intestina laborent, vel aluus nimis lubrica sit: tum namque oleo est parcendum.

Sin verò balanus satis inuenerit: fiat e melle cum sale ad duriciem cocto adiectis (si opus est) pulueribus catharticiis. Esto autem palanus 4. vel 5. digitos transversos longa: minimum digitum crassa.

Vteri, hystericiis, clysteriis, vel pessis.

In vterinis clysteriis, & liquoris, & catharticatorum dimidium tantum sumatur.

Pessarum verò esto quam balanus mole crassiore, nec non longiore.

Vesicæ excrementa sunt iniectis tergentibus eluenda.

Haftenus ratione quadam peccantia; sequuntur toto genere aliena.

Quod toto genere alienum est, id per
ritus corpore extirpandum: & si qua
litatibus alienum sit, secundum has al
terandum.

Toto genere alienum est vel liquidum:
vel solidius quid. Quod liquidum est vel
flatus est: vel humor.

(**Flatus** est) calefacientibus & attenu
antibus digerendus: atque si quem ha
beat fouentem humorem, is primum
est purgandus.

Humores toto genere alieni, sunt ex
aliis naturalibus corruptis: ut atra Bilis
triplex ex Melancholia, pituita salsa,
bile.

Bilis vitellina, prassina, æruginosa.
Pituita acida, salsa, vitrea.

Solidius quid est duplex: vel Anima
tum vel Inanimatum.

Animatum: ut vermes, dracunculus.

Inanimatum, ut pus, sanguinis gru
mus, calculi, arenulae, topi, materia mel
seum pulticulam referens.

*Haec tenus opera praua, sequuntur temere
irruentium partes.*

Hæ si corpori inhereant, eximantur (si opus est) instrumento, eadem qua ingressæ sunt via; si fieri commodè queat, sin minus (loci natura ferente) in aduersum protrudantur, si acumine ea prædita sint: vel arte via paretur.

Hæc de causis fouentibus, atque de ametria causis fota.

Ametria simplex duas obtinet species: Dyscraticam, vel dysdiaplasticam.

Dyscrasia curetur remediis contrariis qualitatibus præditis: eisque tantum physicis.

Remedia; vel vis, aduersa dyscrasiis adhibita, parti affectæ quam proximè liceat applicetur.

Dyscrasia est vel partium aliquarum: vel omnium.

Est porro vel elementaris, vel venenata.

Dyscrasie causa.

Causas procataceticas, vel primas, habet diætæ errores, vel temere irru-

entia, eisdem qualitatibus prædita.

Internas, vel a primis, opera vel qualitate, vel quantitate praua: (qualitate per se, quantitate per accidens) vel temerè irruentium reliquiæ, talibus qualitatibus prædita.

In dyscrasia curanda, vberius adhibeantur quæ in prophylactica ad sanitatem secundum crasim flectentem dicta sunt.

Dyscrasia interna (si ventriculi temperies reluctetur) vel viscerum aliquod, præcipuè topicis est alteranda: atq; tum sumendorum vsus mitigandus.

Dyscrasia elementaris est vel
 Calida.
 Frigida.
 Humida.
 Sicca.

Dyscrasia calida signa.

Corpus solito calidius, iustoque. Si vniuersalis sit calor, pulsus celerior, & frequentior, atque respiratio similis; si particularis sit, secundum illam partem corpus calidius, & rubicundius.

Cause

Causa prima, atque procataretica dyscrasia calida.

Diætæ error calefaciens : vel temerè irruens calidum.

Ex diætæ erroribus , motus immoderatus , & labor immensus : vt exercitationes , studia , perturbationes vehementes ; ira , curæ , vigiliæ . Humorum calidorum excretiones impeditæ , vel fuliginosorum excrementorum .

Ex fomentis , aër estuans , Insolatus , vel ab exercitatione & balneis , ambiens nimis frigidum . Cibi aut potionis penuria , vel meraciora hæc atque calidiora . Atque frigide potio ab exercitatione , vel balneo .

Antecedentes causa & secundaria.

Si vniuersalis dyscrasia sit , cacochymia biliosa , vel sanguinis plethorica redundantia : vel in his , qualitatum intensiões . Sin particularis sit , eadem in partibus feruentes . Porro chyloticum excrementum retentum , & inaspectabilis perspiratio cohibita , huius causæ esse poterunt .

terunt.

Temere irruentia sunt vstiones, vel rei irruentis particulae feruidę adhuc corpori inherentes.

Remedium.

Causę ordine amoveantur. Bilis purgetur (quo motu maximę fertur) vomitu, vel secessu. Sin autem opera qualitate acrimoniam, vel feruorem nactę sint, hęc eadem refrigerantibus sunt temperanda.

Ametria calida est cautę alteranda: presertim vbi pars publica, & ex publicis princeps aliqua laborat: item cum membrum natura sua frigidum sit, cautio maxima est adhibenda.

Dięta frigida esto, atque refrigerans tota, & ex liquidis, ac mollibus, vt hordeatum, viscera ex pullorum gallinaceorum carne vel similibus, lactuca, portulaca, oxalyde, &c. alterata.

Somno indulgendum, nisi viscera calore laborant.

Balneum his conuenit aquę dulcis, & ab

& ab eo vnctiones ex oleo violaceo, vel alio refrigerante si vniuersalis ametria sit. Epithemata partibus principibus Cordi, atque Hepati astringentia, Cerebro nequaquam: denique vndique si vniuersalis ametria sit, medicamenta frigida sunt applicanda: sese excessus gradibus equantia. Viola hordeo, cucurbita, cucumere, nymphaea, portulaca, cicuta, papauere, &c.

Ex aliquarum partium calidis dyscrasiis, quæ cordis est, Febris dicitur.

Febres inter se complicari solent.

Febris signa.

Calor molestus: pulsus crebrior, atq; celerior: vrinæ coloratiores: Spiritus frequentior, atque totius corporis condolentia, nec tamen procatartica subsistens quæ horum symptomatum causa esse poterit.

Cause.

Ametriæ calidæ autores vehementiores

tiores, cor ipsum petentes.

Therapeia omnium febrium communis.

In omnibus febribus diæta esto solito parcior, & tenuans, & ex nutrimentis concoctu facilibus.

In ipsa morbi exacerbatione, nullum alimentū præbendum: nisi inedia, vel insignis aliqua vacuatio ametriam intulerit: tum namque etiam ipso morbo inuadente ægroti sunt cibandi.

Tenuis autem nutrimenti ordo talis existit: Tenuissimum aqua saccharata, secundum hanc amygdalogala, ptisanæ cremor, vel succus mali punici, aut sydonii. Tum integri fructus æstiuu deuorati, hordeum decortdatum, & accuratè coctum. Quarto panis purus, pisces saxatiles, & ex his, qui dura carne sunt præditi. Ultimó pulli gallinacei, & agni extrema: vinum oligophorum. Nutriendi tempus aptissimum, est febris initium, quo & plenius febricitans cibari poterit: versus incrementum parcior cibus esto: In statu omnino nullus, nisi vires succumbant; tum namque ex tenuissimo
sunt

sunt reparandę.

Ceterum quacunque hora melius se habuerit egrotus (quod fere mane est) cibus ei offerendus : atque vniuersus tantum esto ad vires sustentandas : & hora qua sani cibari erant assueti (modo egritudo permittat) sumatur.

Quo febris vehementior, eo parcius ægroti sunt cibandi, atque celerius : multo magis cælo digerente, & etate puerili : si tamen vires ferant in febribus vehementibus, cibus per initia omnino circumcidi poterit : a quo initio, tenuis admodum sit, sensim ad statum diminuendo.

Potus in ipso accessus vigore, esto vnus vel alter haustus satis largus.

Febricitantes in luce habendi sunt omnes, (nisi sint valde infirmi) & quam maximo conclaui cubare debent.

Si quando vires febricitantibus deficient, aëre frigidiorē inspirato, & stillatio aliquo analeptico recreentur.

Vbi febres inter se complicantur, & remedium complicandum : vrgentioris maxima habita ratione.

Atque hæc febrium communia sunt.

Febri-

Febrium duæ sunt species: Schetica:
& Hæctica.

Schetica febris est, quæ extra solidas
corporis partes, causas fouentes habet.

Scheticam pariunt causæ leuiores.

Schetica febris duplex est: vel spiri-
tus accensis: vel humoribus.

Spiritus accensi Ephemeram pariunt:
24. horarum febrem: quæ interdum diem
secundum attingit.

Ephemeræ signa.

His suavis adest calor, rara, aut nulla
in vno pulsu inæqualitas, eaque admo-
dum obscura. Pulsus magni. Urina haud
valde absimilis sanorum, rufa tamen, fa-
cile ægritudinem ferunt, nec vlla tenus
vires succumbunt. Vel sudore, vel ma-
dore, vel transpiratu halituoso solet de-
finere.

Causæ.

Procatacéticas tantum solent ephe-
meræ habere causas, eas tamen (quod
solæ sint) tanto vehementiores. frequen-
tius tristitiam, curam, vigilias, lassitudi-
nem,

nem, cutem astrictā, ex frigore, vel alio quolibet diætę errore: vt suppressa excrementorum vacuatione.

Remedium.

Aër omnibus Ephæmeris, inspiretur frigidiusculus, corpore reliquo operimētis bene contecto, atque haud supra primum gradum refrigerationis tam pharmaceutica, quā diæteticæ hęc vsus esto.

In Ephemerę declinatione, antequam cibus concedatur, corpus molliter fricandum, manibus oleo violaceo recenti, vel loto, perunctis: & nisi inanitio febrem intulerit, & corpus calidum atque siccum naturā sit, prorsus abstinere satius foret: vtque postero die, cum tempus accessionis ita transiit, vt nil mouerit, cibus dari poterit. Sin autem ex alto calor venerit, & grauitas vel capitis, vel præcordiorum sequuta est, quia febris humoralis timeri potest, expectandus dies tertius: atque vbi accessionis tempus præterierit, (quia adhuc timor superesse queat febris humoralis) cibus exiguus dandus: atque die quarto (si corpus integrum sit) cum fidu-

E

cia

cia dari poterit.

In Ephemerarum statu, largus potus esse poterit vini oligophori.

Hic Ephemerarum varietas ex causarum procatacticarum vbertate distinguitur.

Si fames, vigilia, coitus nimius, vel alia quælibet inanitio febrem intulerit: his pallet facies, & oculi caui fiunt, propriè autem quibus vigilia intulerit, facies subtumida existit, & vix oculorum palpebras attollunt, humore quodam imbutas. Atque omnes, vigiliis, curis, cogitationibus febricitantes, pulsum magnitudine destituuntur: & qui ex tristitia febricitant, his acrimonia potius quàm abundantia caloris percipitur.

Remedium.

Statim ipso accessu, ægroti sunt cibandi: maximè quibus corporis temperies, ad calidum, atque siccum vergit: aliter abstinere præstat: & vbi accessio remiserit, in balneum continuo sunt perducendi, & tepente oleo largissimè perfundendi.

di debent: tum molli manu fricari: atque diutissimé in calidi solii aqua morari: & frequentius lauari. Nisi caput dolet, his vinum vtile.

Qui ex labore ac lassitudine, febricitant, cutem habent sicciorem.

Remedium.

Hii sunt multum oleo tepido manu molli fricandi. Hiiis etiam conuenit satis largiter vinum bibere pro ratione virium, ætatis, consuetudinis.

Qui ex cute astricta febricitāt, cutem densam obtinent: & primum tangenti, mitior percipitur calor; post acrior: absq; vrinis rufis, absque mole corporis concidente, vel oculis cauis, aut aridis: neque pulsus hic minores.

Remedium.

Friçtio rarefaciens, a balneo aquæ dulcis temperato adhibeatur: & nisi supra modum refrigerati sint, & corpore pleno: Vinum his conuenit. Sin ex frigore oriatur, & pariter accesserit capitis grauedo, & distillatio; lotiones,

& balnea sub finem tantum fiant, his prius concoctis.

Qui ex æstu febricitant, (quod ex pregresso errore percipitur) quamprimum in balneum aque dulcis ducendi, & multum lauandi, atq; post, oleo violaceo vngendi, & magis lauandi, quam vngendi, & frequentius: Et caput perfundendum oleo omphacino sine sale, vel rosaceo, violaceo vehementer refrigeratis, & capiti superfusis.

Si cui ex ira contigerit febris: primum ea sedetur: tum in febris declinatione, balneum, vinctio, frictio, ex oleo violaceo, nenupharino, &c.

Haftenus febris Ephamera; sequuntur humorales.

Humoralis febris est, ex calore humores primum inuadente, atq; per eos cordi ametriam procreante.

Signa.

Hæ calidiores sunt Ephæmeris omnes: atque dierum plurium: pulsus item ex systole celeri sunt hîc inæquales.

Causa

Causa.

Causas habent humorales, præter pro-
catarticas, & primas, succorum item vi-
tia, fouentes internas, & a primis.

Humoralium commune.

Humoralibus initio, phlebotomia cō-
uenit (si vires ferant) alio prius (morbo
inducias dante) clystere soluta, eoque
horis duabus ante sanguinis missionem
iniecto.

Sin autem morbus festinationem po-
stulat, sanguis, vel præterito clystere
mittatur.

In humoralibus, vbi status morbi ad-
est, vel imminet, (quod ex symptoma-
tum incremento percipitur) nil vacuati-
onum moliendum. Si quid tamen hu-
moris expurgandi publicis viis obsistat,
præparatus prius, omni morbi tempore,
deici poterit.

Humoralis febris est vel sanguinea, vel
biliosa. Sanguinea est, in qua sanguis ac-
cenditur: atque Synochus dicitur.

Synochus vnicam accessionem ha-
bet.

Signa Synochi.

Vrinæ rubicundæ, crassæ: pulsus magnus, vehemens, plenus, nec mollis, nec durus, celer, frequens. Caput dolet, fauces rubent, venæ ex tensione laborant: corpus madet: fatuitas linguæ imponit, vel dulcedo. Ager intumescere se putat, & ægré spirat.

Causa.

Sanguis redundans, iustoque calidior.

Remedium.

Quantum vires ferant, tantum hîc sanguinis vacuandum: etiam si prius sponte fluxerit, nisi morbum extinxerit, vel saltem diminuerit.

Si natura sponte sua mouerit, quod hîc paribus diebus facere solet, eius motui succurrendum, siue ab hæmorrhoidæ, siue a nare, siue ab utero, nec nisi, nimius fuerit fluxus obsistendum.

Epithemata refrigerantia, in statu tantum, idq; concoctionis signis apparentibus,

bus, vsurpanda.

Cum evidentes concoctionis notæ apparuerint, nec principem partem inflammatio occupet, nec tumor oedematodes, aut schirrhus, nec partium internarum imbecillitas vlla, aquam frigidam largiter & audacter propinato: præcipué si ægrotus frigide sit affuetus.

Synochi febres tonos obtinent.

Tonus est Synochi febris certa affligendi ratio.

Tonus est duplex: vel Homotonos: vel Ditonos.

Homotonos est cum æquabiliter affligit: eo quod non minus caloris exhalat, quam generatur.

Ditonus est cum inæquabiliter affligit: eo quod vel plus, vel minus exhalat.

Ditonus est vel Epacmasticus: vel Paracmasticus.

Epacmasticus est qui semper inualefciendo inæquabiliter affligit: cum plus generatur, quam exhalat.

Paracmasticus est qui continuo decrefciendo inæquabiliter affligit, eo quod

minus generatur quam exhalent.

Synochus est, vel mitior: vel vehementior.

Mitior est, cum sanguinis pars tenuior accenditur: & Ephæmera extensa dicitur.

Ephæmera extensa, non raro ante diem quintum iudicatur.

Signa.

Oritur potissimè vere, & Autumno, adolescentibus sanguine multo refertis.

Vrinæ sunt similes Ephæmeris, & ægroti inflationem percipiunt: hîc pulsus inæqualitas est obscura.

Remedium.

Dietę erroribus cessantibus, intra primum triduum, ad lypothymiam sanguis mittatur: in qua tamen lypothymia, ægrotus audit, videt, astantes agnoscit, &c.

Cum optio datur, hora matutina (duabus horis a phlebotomia) cibetur ægrotus, cibus frigidis & humidis.

Nisi sanguinis missio febrem extinxerit, aqua frigida largissimè hauriatur: quod
fi

si quid dissuadeat, frigidus aliquis syrupus, ut acetosus, vel violaceus aqua frigida dilutus propinetur.

Parcendum hinc somno: nisi ubi sanguis primum missus fuerit: atque tum (duabus a phlebotomia horis) somno indulgere poterit egrotus.

Haftenus Ephæmera extensa, siue Synochus mitior, sequitur vehementior.

Synochus vehementior est, cum sanguinis tota massa ferueat.

Signa.

Cruditatis nota hic adest in pulsu, ut inequabilitas manifestior. Et in urinis quæ hic rubræ, turbidæque existunt. Expiratio quam inspiratio hinc insignior: lingua tandem asperior nigricat: & non nihil amaricat: Capitis dolor vehemens, & continuus urgere solet.

Hic toni sunt euidentiores: & ex tonis, paracmastica haud vacat periculo: mox consistens.

Periculosa signa sunt inquieté fatigari, dyspnæa multum infestari: ventrem

inflari atque rugire : pustulas nigras , atque
liuidas apparere : in voluntarias lachrymas
perfundere : a somno laborem sentire : atque etiam
aëre ambiente frigido, admodum vri,

Causa.

Sanguis multus , calidior : atque vehementiore
paracmastica accensus.

Remedium.

Hic sanguinis minus quam in precedente
vacuandum : & tantum citra lipothymiam est
consistendum.

Potest in hac & quarto, & septimo, etiam
post septimum sanguis mitti.

Si sanguis valde calens sit, (materia
copiosa ac furente) levis purgatio vel
clyster purgans ex usu erunt. Sumatur
autem pharmacum colaphygun diluculo
post phlebotomiam. Post veró & phlebotomiam
& pharmacum, humectanti, atque refrigerante,
& diætæ & medicationi incumbendum, dum
dies decimusquartus aduenierit : atque tum
(mor-

(morbo a natura victo) sensim pleniorē victu ægrotus, reficiatur, eo tamen solito humidiorē, frigidiorēque.

Hactenus febris humoralis sanguinea; sequitur biliosa.

Biliosa febris est ex accensa bile procreata.

Signa.

Pulsus quā in prædictis magis inæquales, & systole multo citatior. Calor mordax & acris, Urinæ valde crudæ.

Cause.

Biliosa febris habet tam procatarecticas causas, quā internam fouentem cacochymiam. Succedit item ab Ephæmera quæ ad integritatem haud desicrit.

Biliosa febris periodos obtinet.

Periodus est febrilis accessus reciprocatio.

Periodus est vel stata, ac typica: vel vaga.

Typi-

Typica est, quæ certas, & ordinatas habet reciprocationes.

Vaga periodus, incertas habet.

Stata periodus est vel celer: vel tarda.

Celer est, quæ quotidie affligit: ex nouæ materiæ generandæ facilitate.

Tarda est, quæ extra quotidianam est: ex materiæ generandæ difficultate.

Tarda est vel Tertianæ: vel Quartanæ.

Tertianæ est, quæ tertio die reciprocat.

Quartanæ est, quæ quarto reciprocat: & huius materia difficillimè regeneratur.

Est porro febrium periodus duplex: vel Remissionis: vel Intermissionis.

Vbi periodus remittit, quam integerrimo cibus offerendus.

Remittentes periodi sunt tantum, quibus materia est copiosa, vel crassa. Atq; hîc copiosior vacuatio est molienda: & victus tenuior imperandus.

Intermittentes periodi sunt ex materia parciore, nec non tenuiore. Hîc vacuandum parcius, & ipsa quiete, tanto ante accessionem tempore, vt ante ipsam com-

compleri queat.

Intermittentibus periodis, antequam ex toto integer sit egrotus, cibus offerendus: atque is copiosior quàm in remittentibus. Atque in his si tardet accessus longe ab exacerbatione, .i. sex vel 8. horis post, cibus offerendus: quibus horis egroto vigilandum: sumpto autem cibo dormire permittendus.

In intermittentium inuasionibus, vomitiones utiliter mouentur.

Intermittentes periodi, paroxysmum habent frigidum in primo insultu.

Hæc de Periodis.

Biliosæ febres inter se complicantur: interdum vna pluribus: atque tum accessiones haud pares sunt: Sed quæ diebus morbo congruentibus accidunt, vehementiores sunt: Cæteræ remissiores. Atque si ambæ intermittant, nulla quies ægroto accidit.

Per initia febrium biliosarum, rhabarbarum, & astringentia, pharmaca sunt vitanda.

Biliosa febris est vel ex bile flaua: vel atra.

Ex

Ex bile flava est, cūm hæc febrem accendit.

Causam habet cacochymiam biliosā. Hæc colaphygo ducenda.

Febris biliosa flava est, vel cūm bilis sese materiam foco præbet: vel aliam materiam accendit.

Si bilis foci materia sit, iecori imprimis est consulendum, quod potissimum hīc infirmatur.

Biliosæ vbi aliis eiusdem generis implicantur, diebus imparibus plus paroxysmos intendunt: quibus accessus fiunt.

Biliosæ hæ, si haud intermittant, sed remittant tantum, febris causos dicitur: magna vehementia vrens. In causo frigus, rigor, aut horror vbi finitura est: aliās raro.

Causonis signa.

Color acerrimus, anxietas, iactatio corporis, velut contracti: lingua arida, scabra, citrina, vel nigra, sitis inextinguibilis, circum ventriculum, aut hepar mordicatio, dyspnœa: alui excrementa crocea: vrina tenuis valde:

&

& ad liuidum inclinans. Nonnunquam hinc præcedit (quod rarum est) insignis rigor, valde pungens. Pulsus est frequens, velox, & quodammodo durus: Superueniunt vigilię, aut profundior somnus: aut vigilandi impotentia. Delirium, & ab ea interdum vera phrenitis: interdum conuulsio: & cordis agitatio maxima: sufficula, sudor leuis in fronte, & clauiculis: alibi cutis, valde arida.

Pessimum signum estus cui non respondet sitis: vigilię iuges, & delirium: color faciei insigniter immutatus: lentor circa dentes: vomitus, & deiectio merbiliosa: vrina valde tenuis, cruda, nigra, pauca, cum aluo astricta: vel aluus nimis lubrica pinguis excernens. Nares sanguinis guttas stillare, illachrymatio spontanea: Externis partibus non admodum calere, aut etiam frigere, nec facile pristino calori restitui: aut diebus paribus morbum exacerbari: ante septimum diem auriginem apparere: aut sudare, nihilominus febre crescente.

Causa,

Causa.

Procatarcticæ: ex diætæ erroribus, quæ vehementissimè calorem intenderint: imprimis potus abstinencia per magnos æstus.

Antecedens: vitellina bilis sincera, & retorrída: magis in causo, minus ubi tertiana continua (quæ ab hac causo gradu deficit) affligit.

Remedium.

Ægroti quoad fieri potest, quietem agant.

Victus esto liquidissimus: ut viscûla ex pullo alterata lactuca, oxalide, plantagine, &c. Pruna acidodulcia. Potio largâ.

Hic sanguis mox ab initio, citra moram mittatur, etiam (prius iniecto clystere) die eodem quo primum inuadit.

Sanguis mittatur ad euentilationem tantum: & longe citra lipothymiam ad ℥.iiii. vel li.ß. Si quid sanguinis missionem dissuadeat, cucurbitulæ cum scarificatione applicandæ: vel hirudines affigendæ.

Die

Die secundo, leni cholaphygo purgandum: & scammomatis prorsus abstinendum: & modo nil dissuadeat, aquæ frigida potus esto vberimus: Si quid dissuadeat, acidus syrupus de limonibus, de acetositate citri, &c. aqua diluendus, & propinandus, vel etiam necessitate urgente haud negandus papaue-
rinus.

Declinante morbo, & statu transacto, epithemata vsurpentur ex sympatheticis partibus principibus: vel potius capiti raso, thoraci, hypochondriis, plantis pedum, pulmones recens mactatorum animalium, aut catelli vel pulli gallinarum, aut columbarum, per spinæ longitudinem sectorum admoueantur: vel lanæ hapsus oleo violaceo repente imbutus applicetur.

Die septimo peracto, si quæ morbi reliquæ suspectæ fuerint, purgatione sunt deiiciendæ: & diaphoreticis, atque diureticis proliciendæ.

Si tertiana continua sit, haud tanta vis vrget morbi, nec feruor tantus: Ergo tum quarto die medicamentum purgans

præberi poterit : & cibi hæc poterunt esse frugaliiores, quàm in causo, tunc tamen omnes.

In causo symptomata vehementissime affligere solent, & medicum poscere : secundum hanc, in tertiana continua.

Sunt autem hæc: imbecillitas, oppressio, tussis, lumborum dolor, cephalalgia, vigiliæ, paraphrenitis, sitis inexplibilis, linguæ ariditas, nigredo, asperitas, fissuræ, lentor dentium, linguæ, palati, cibi fastidium, bulimus, lipothymia, syncope, singultus, nausea, vomitus, alui fluxus, alius astricta, aurigo, sudor.

Ad imbecillitatem.

Hæc aëre frigido, & puro recreetur, & aceti rosacei odore.

Ad oppressionem, & hypochondriorum tensionem.

Sedantur hæc citato vomitu, vel purgante medicamento, clystere, potius quàm potione, si ex materia copia sit:

Sin

Sin vero nimio calore oppressio fiat, aër refrigeretur, & halitu, haud naribus inspiretur: ad cordis regionem epithemata frigida applicentur: vel potius olea refrigerantia, nenupharinum, violaceum, papauerinum, &c.

Ad tussim.

Hypoglottides sub lingua teneantur, ex leniente, ac refrigerante materia, vt ex glycyrrhiza, gumi tragacantha, feminibus frigidis maioribus, &c.

Ad lumborum dolorem.

Lumborum dolor refrigerante linimento est placandus, vt refrigerante galeni, cum succis frigidis.

Ad Cephalalgiam: hac frontem & tempora occupare solet.

Omnis motus & corporis & animi vitetur: lux & strepitus. Vnctiones frigidae, atq; humidae vt populeon, &c. adhibeantur: & embrocha atque frontalia, ex frigida, humidaque materia vsurpentur:

Et cucurbitulæ cum multa flamma ad homaplatas, aut cernicis radices affigendæ, & frictiones partium extremarum curandæ, & eisdem vincula dolorifica iniicienda.

Ad vigilias.

Vigilantibus tenebræ inducendæ, & alta quies, atq; altum silentium imperandum: nisi aquæ murmure, vel musica leni, vnico sensu occupato, communem consopire consilium sit. Frigida odorandum, & eadem capiti, atque temporibus capiti applicanda. Si opus est a proprietate hypnotica sumenda ex syrupo papauerino, nenupharino, de portulaco, &c. vel medicamentum diacodion quantitate dimidii cochlearis ore teneatur & exsputum post, recens sumatur dum somnus obrepat, atq; tum qui vltimo sumitur, in ventrem illabi sinendum, vel theriaca duorum mensium quod ℥i. clysteri indi poterit, & postea subiici. Porro, in partium principum emunctoriis, vnctiones refrigerantes applicentur, & ad vasa maiora: item his ipsis irrigationes,

nes, & epithemata adhibenda.

Ad Paraphrenitim.

Hic initio, refrigerantia, & astringentia applicentur: oxyrhodyno misto, &c. Et ab his (malo procedente) capiti raso, recens macerata animalcula applicentur, & frictiones manuum, ac pedum, & ligaturæ dolorificę adhibeantur, & continuus aquæ frigidæ odoratus esto.

Ad sitim inexplebilem.

Per nares ægrotus expiret ore clauso: somno, & silentio indulgeat, (nisi quid grauius somnum dissuadeat) & syrupus aliquis acetosus aqua frigida dilutus propinetur: vel humectans, atque refrigerans: vt de portulaca, de cucurbita, &c.

Sin autem sitis mendosa tantum sit, ex pulmone æstuante frigidissimus aer inspiretur: & aqua frigida subinde ore teneatur, & cum incaluerit, mutetur: vel cerasa ficca, acidula ore mandentur: & saccharum chrySTALLINUM ore contineatur.

Nisi hac arte fitis restinguatur, post duas horas, potus satis largus, & bene refrigeratus haustu magno propinetur.

Ad linguæ, palati, dentium; ariditatem, nigredinem, asperitatem, fissuras, &c.

Liniantur hæc lento, humectante, refrigerante, atque detergente aliquo: ut hordei mundati decocto, cornis prunorum dulcium, cucurbitæ, cum saccharo chrySTALLINO, penidiis, & succo glycyrrhizæ ad eclegmatis consistentiam.

Lingua decocto hordei frequenter tergeatur, & asperiore linteo, vel cochleari, diligenter fricetur.

Si fissuræ molestæ sint, glutinentur seminibus cydoniorum cum gumi arabico, tragacantha, ichthyocolla &c. horum mucilaginis decocto præcedente maceratis, & dissolutis.

Porró gutturi, foris, olea humectantia, & refrigerantia, leniter gutturi infricanda: ut violaceum, nenupharinum &c.

Si

Si oesophagum lentor occupet, præmisso gargarismate, ex attenuantibus, & abstergentibus: vt glycyrrhiza, iride, hordeo integro, hyssopo, &c. bolis crassioribus deuoratis abradatur: vel potione tergente affatim diglutita abstergeatur: vt decocto hordei cum saccharo, & aceto pauco, vel syrupo acetoso, &c.

Ad cibi fastidium.

Acidi intinctus apparentur: & aqua frigida potetur cum tantillo aceti: & malum citoneum, vel granatum acidulum edatur. Porro, varii cibi, minimè pingues aut prædulces, apponantur, & aceto rosaceo, omphacio, oxalidis, vel granatorum succo condiantur. Præterea fastidientibus capparees conueniunt, falsamenta, oxypora ex lactuca, oxalide, cichorio cum aceto, atque oleo parcissimo.

Cibus parcè, & raris interuallis sumatur. Atque nisi hac arte cibi fastidium pelli poterit, (deterfis prius intestinis) clysteres nutrientes infundan-

tur : quantitate parca, ad vires, & corporis molem, bis, vel ter quotidie, horis pastui dicatis.

Ad Bulimum.

Alimentum valde tenuium partium hic esto : & frequenter acetum, pulegiū, mala, pira, & similes fructus olfiant, & cætera nidore bono plena : vt panis calidus, suillæ carnes assæ & panis vino intinctus sumendus, vinum ipsum : oua sorbilia.

Ad lipothymiam, & syncopen.

Alimenta omnia sint substantiæ tenuissimæ, & quæ celerrimè vires reficiant : vt panis assus, & vino generoso maceratus, multo saccharo, & vino generoso conditus, oua sorbilia : pullorum gallinaeorum testes : gallinæ, aut capi iuuenis decoctum expressum : panis calentis odor frequentissimè ore, & naribus excipiendus. Vinum esto oligophorum.

Corpus oleo rosaceo, myrtino, melino Mastichino &c. vngendum, subucula rosacea, santalis, camphora, macerata, & post

post ficcata, inducenda.

Sin autem syncope præhenderit, vinum fuluum, subausterum, & vetus propinandum: & frictiones extremorum adhibendę.

Ad singultum.

Vomitum citetur: & pharmacum cholaphygiū propinetur: & ab eo, cremor ptisanę, vel amygdalogala, lac caprinū, vel asininum recens multum sumatur. Sin vero æstus vehemens vrgeat, quatuor seminum frigidorum maiorum emulsio ex usu erit: nec non theriaca recens, vel philomum Romanum præbenda. Cucurbitula cum multa flamma ad regionē ventriculi applicanda: Vincula artubus iniicienda, & frictiones dolorificę usurpandę.

Ad nauseam, ac vomitum.

In nausea si quid humoris inesse suspicio fuerit, ipse vomitu est quàm primum eiiciendus.

Si vomitus nimium laceſſat, somnus concilietur, & quies: & acetum rosaceū,

vel aliud quid odore gratum naribus ad-
moueat: atque vomitum stimulantis
materia clysteriis, & artuum ligationi-
bus reuellatur. pedes, & manus in calidā
aquam immittantur, & cucurbitulæ ven-
tris regionem suspendant, quo tempore
cibus laboranti offeratur.

Quod si nec ita vomitus sedetur: ven-
tricus pharmaco constringente est
purgandus: vt diacydonio laxatiuo, ad-
mistis myrobalanis emblicis, vel citrinis.
Post huius purgatorii vsum, etiam iam
operante medicamento, aliud cydoni-
um astringens sumatur: additis cornis,
& prunis syluestribus: vel alio astringen-
te aliquo.

Aër esto frigidus, & ficcus: cibi sic-
cantes, & astringentes, vt ex amylo, ori-
za, &c. Lac chalybeatum, & ex eo po-
lenta cum hordei torrefacti farina. Om-
nes carnes succo malorum granatorum,
limonum, aranciorum, &c. condiantur.
Vinum esto antiquum, subausterum, a-
qua chalybeata dilutum. Potus frugalis
esto: cibus exiguus, & ea interualis sum-
ptus, actu vel frigidus, vel calidissimus.

Post

Post alios cibos, edantur astringentia: vt cydonium coctum, &c.

Ad alui fluxum.

Humoris acrimonia prius epicerafticis fyrupis eft mitiganda: vt violaceo, hordei decocto, lacte amygdalino, item clyfteriis epicerafticis aluus eft perfundenda: & poft, catharticum astringens ex rhabarbari infuso eft propinandum. Corpore autem purgato, diaphoreticis vtendum: & ab his astringentium vfus multus efto: vt fyrupi de ribibus, de cornis, &c. conuenienti liquore diluti: & abdomen oleo cedoniorum, myrtino, maffichino, &c. astringentibus admifto aceto vngendum: fi opus eft, clyfteres astringentes iniiciantur: & cucurbitula vmbilici regio fufpendenda. Hic, primi cibi fint astringentes: & astringentes fructus. In primis (aluo nimium profluente) fomno, & quieti eft indulgendum.

Ad aluum aftri&ta.

Aluus aftri&ta glande irritetur, atque
venter

venter oleis mollientibus foueatur. Sumantur autem iuscula quibus multa borrago, oxalis, portulaca, atriplex, malua, incoxerint. Pruna edantur dulcia: & fructus horarii, maturi: post quos aqua pura bibatur. Decubitus supinus vitetur. Et clyster molliens & tergens ex decocto maluarum, helxines, furfurum, admistis oleis refrigerantibus, vt violaceo, nenupharino, rosaceo & iniiciatur.

Ad auriginem.

Balneum ex tergente materia impetretur atque attenuante: vt, ex bryonia, enula campana, parietaria, furfure, beta, brassica, &c. A balnei egressu, corpus oleo chamæmelino vngatur, vel costino, vel irino, &c. Et frictiones fiant frequentes, & molles. Sin vero in venis quid subsit humoris, nec totus in corporis habitum fusus: id primum cholaphygo purgandum, & tum cætera peragenda.

Ad sudorem.

Aër frigidis temperetur: & si opus est, euentiletur. Mollis culcitra, detrahenda:

&

& facies posca frequenter inspergenda:
 Potiones sumantur viscerū roboratrices,
 vt decoctum borraginis, buglossæ cum
 syrupo myrtino, & santalis &c. vinū esto
 astringens, & paucū vt & potio omnis.

Sudor sinendus concrefcere, nec ab-
 stergendus: & pannis aqua rosacea, cum
 santalis, comphora, &c. madentibus, &
 egelidis inuoluendum corpus: & totum
 (si opus est) præsertim ad cor, iecur, tho-
 racis, atque ventris partes, oleo rosaceo,
 cui pulueris myrtillorum, vel santalorum
 aliquid admistum sit, inungatur.

*Hactenus symptomata, quæ in hac febre
 medicum implorare solent.*

Sin autem viliosa hæc intermittat,
 tertianam vulgo intermittentem dictam
 parit.

Intermittentes hæ dupliciter compli-
 cantur: vel cū eodem die: vel diebus
 alternis binæ accessiones fiant. Est hæc
 humoralium intermittentium breuissi-
 ma: septimum accessum non prætergre-
 ditur: sæpè quarto definit. Et tertio, vel
 quarto die, vrinæ incipiunt apparere co-
 ctæ. Accessus paroxysmus longissimus
 est

est 11. vel 12. horarum : frequentius
5.6.7. vel 8. horarum.

Signa tertianæ intermittentis.

Inuadit cum vehementi rigore velut
acri quadam re pungente. A quo rigore,
ardor excitatur acerrimus. Pulsus euadit
magnus, vehemens, celer, frequens,
æstuans, & omnis inæquabilitatis præter-
quam febrilis expers, quæ in vno pulsu
deprehenditur.

Causæ.

Hæc easdem habet cum prædicta cau-
sas, remissiores tamen.

Remedium.

Primo die quietis, (pro ægroti viri-
bus) ad ventilandum corpus sanguis
hauriatur 3. vi. vel 3. viii.

Die sequente, multo ante paroxysmū,
(si tardior is futurus sit) & horis pome-
ridianis accidat) medicamentum leuiter
purgans imperetur, etiam natura sua re-
frigerandi viribus pollens : vt electuario

de

de psyllio, dia damasceno, cum syrupo refrigerante ex hordei decocto diluto.

Si locus nullus purganti pharmaco die tertio detur, quarto imperetur.

Ceteris diebus, extra paroxysmum, alius tenerrima teneatur clysteribus refrigerantibus, humectantibus, & mollientibus. Deinceps verò, alterationi, & bilis temperationi, est prorsus studendum.

Manifestis signis concoctionis apparentibus, validiore pharmaco est purgandum: etiam astringentia admittente. Atque tum postea, balneum calidum adhibendum: videlicet eo die, qui grauiissimum paroxysmum sequutus est: quo & salubriter iterari potest. Deinceps verò, diureticis, & diaphoreticis sudorificis vtendum.

Eandem ægroto morbo perfuncto: hepar triasantalo, vel diarrhodone Abbatibus firmandum, atque recreandum est: & deinceps, (certo spacio) diæta quodam modo esto febrilis.

Hactenus febris biliosa, in qua bilis flava materia

*teriam se foco præbet; sequuntur in quibus
alios humores accendit.*

Febres hæ, ferè diebus paribus accessus habent. Atque ubi intermittūt, rigor hîc nullus: sed potius horror. Atque abscessibus fere, potius, quàm excretionibus finiuntur.

Longiores sunt prædictis, & ultra 40. diem: atque accessus ultra duodecim horas habent.

Ubi sui generis febribus implicantur, die pari maximè intenduntur.

Signa.

Hîc quàm in prædictis minor feruor: & pulsus parvus, rarior, atque tardior quàm in eis.

Causa.

Cacochymia composita interna causa existit: vel per se, vel ab aliis procatarteticis mota, atque irritata.

Remedium.

In his, diætâ paulo plenior quàm in ceteris, esse poterit: & plenior in intermittente,

mittente, quàm in remittente : & tota morbi historia, contra quàm in precedentibus, cibus potu copiosior esto : & vbique attenuans.

Porro, in his, magis humorum preparationi, quàm alterationi est incumbendum : & attenuantia refrigerantibus semper misceantur : quæ in his quàm in prædictis minus frigida esse debent.

Per initia, attenuandum, incidendum, coquendum, aperiendum vehementius : solutiua tamen tum leniora sint, deinceps fortiora, vt scammoniata bene tamen retusa, quæ ex interuallis sunt vsurpanda.

Materia si multa sit, manifesta signa concoctionis haud sint expectanda, sed tum per initia satis valide purgandum.

Signis verò concoctionis apparentibus, oxymel diureticum, syrupus de epithimo, oxymel squilliticum vsurpentur, &c.

Sanguinis hîc parum detrahendum : nec omnino ab initio, sed præparata ma-

G

teria,

teria, & cum urinæ rubentes, & crassæ apparent.

Vena secetur satis amplo foramine, die paroxysmū præcedente. Atque tum, si sanguis tenuis sit, & flauus, continuó est supprimendus. Quantitas detrahenda, haud multum \bar{z} . iiii. excedat.

Item in hisce febribus, ab initio, ad vigorem, rebus acribus est vtendum: pipere, sinapi, diatrion piperion &c. Quarto quoquo die.

Vbi signa concoctionis manifesta apparent, balnea, & thermæ vsurpandæ, & vomitus pridie accessionis á coena citandus: & stomachus postea, oleo absinthii est inungendus. Postridie, datur absinthii comæ decoctum: & ab illo, horis duabus ante paroxysmum, \bar{z} . i. vel $\bar{\theta}$. ii. veteris theriacæ porrigatur. Deinceps veró, diuretica, sudores, viscerum fatus, sedulo curandi: nec non antidota ex interuallis danda.

Atque prædicta communia sunt.

Bilis vel accendit vnum humorem: vel plures.

Ybi

Vbi vnus tantum humor accenditur,
exquisita talis dici poterit.

Signa.

Hæc ex humoris pariter accensi signis, spectanda.

Cacochymia composita duorum accensa.

Humor vnus a bile accensus, est vel pituita, vel Melancholia.

Ex pituita accensa frequentissimè fiunt accessus quotidiani: raró tertiani: quod si contingat, fit tertiana vulgo nota dicta.

Pituitosæ, nocturnæ ferè sunt, & hiemales.

Interdum pituitosæ materiæ copiâ, bis die irritantur: paucitate, diebus alternis.

Qui pituitosis febribus detinentur, humidiores habitu sunt. Pituitosa continua implicata tertianæ intermittenti, parit semitertianam. Hæc continua est cum horrore. Et quanquam prioris accessus in sudores desinat, non tamen

intermittit febris : sed hos altera accessio excipit . Semitertiana hæc , gradus obtinet . Parua 24. horarum existit : media 36 . magna 48. horarum accessum obtinet.

Semitertiana est vel exquisita : vel non exquisita .

Exquisita est, cum ambæ æquipollent. Atque in hac pugna duorum existit : & excretiones febriles tertianæ , retunduntur pituitosæ febris mixture : videlicet ex crasso humore genitæ.

Non exquisita est, ubi alterutra vincit : vel bilis , vel pituita.

Si febris tertiana , bilisque vincat : tota febris fit horridior , & initio rigoris particeps.

Cito mouetur : feruidior existit , & incendii plus habet : & bilis aliquid per vomitum , aut per sedem , aut per sudores excernitur .

Sin autem quotidiana vincat : vix horror percipitur , aut ne vix quidem . Pulsus & magis , & diutius comprimuntur : accessio tardius inualefcit : ac post longum tempus consistit : non tamen aut
fitis

fitis magna, aut incendium fatigant: neque bilis accenditur.

Si ambe intermittant, huic similis oritur mistio: in qua tamen intermissio existit: & die secunda, horrida apparet quotidiana.

Si vitrea pituita sit, quæ accenditur: fit febris epiala dicta.

In epialo, ab egroto continuum frigus percipitur: ab aliis calor: frigus ex fusa materia per sensiles partes corporis habitus.

Accessionem habet epialus a 4. horis, ad 24.

Commouetur 3. item 4. die: raro ultra 20. dies extenditur. porro, quotidiana intermittens interdum tertianæ emula existit: sed accessiones habet 12. horarum spatio longiores: & non raro, diem integrum perseverantes: aut etiam excurrentes longius.

Atque morbus nonnunquam bimestris, trimestris, etiam semestris existit.

Pituitosa Signa.

Vrinæ albæ, ac tenues, vel crassæ ac

turbulente, vel rubicunde. Vomitus pituitosus: nec sitis intensa: grauitas totum corpus occupat: soporosi, atque veternosi sunt.

Pulsus rarus, laxus: facies subliuida, & peponum modo tumida.

Calor primo occurfu ad manum vaporosus sentitur: sed tandem mordacitas increfcit: atque admodum inequabilis ac fi per cribrum excolari videatur,

Remedium.

Hic vacuationes vltra diem feptimum differri queunt.

Iniecto prius clistere, fanguis mittatur. Tum die poftero, propinetur catharticum lene, pituitam bili miftam expurgans.

Post pituita eft attenuanda, & humores præparandi vfque ad morbi vigorem: fyrupo byzantino, acetoso fimplici, oximelite &c. Et poft feptimum accessi-
onis diem, abfinthii coma frequenter eft propinanda.

Si pituita dulcis accendatur, minor præparatio conuenit quàm fi acida: atque minor fi acida, quàm vitrea.

Sin

Sin autē sine excretionē insigni, vel abscessu morbus inclinet, medicamentum purgans paretur astringentia admittens: velut rhabarbarum myrobalanos, &c, atque ab illo pharmaco; sudores mouendi, ac vrinae.

Si tertianam emulatur, alternis diebus aegrotus cibandus: atque intermissionis die, corpus leuiter exercendum. Hic somnus conuenientissimus existit: modō nil caput grauet, nec lassitudinem inferat.

Si febris pituitosa hęc inneterauerit, a cibo interdum vomere, vtilissimum fuerit.

Symptomata hic medicum poscunt.

Ventriculi imbecillitas: syncope humoralis: sopor: capitis dolor: nausea: vomitus: alui fluxus: frigus: cibi fastidium.

Ad ventriculi imbecillitatem.

Ventriculo praesertim in statu, est consulendum roborantibus, & siccantibus sympatheticis: vt aromatico rosato, laetificante Galeni, &c.

Ad Syncopen.

Purgatio imperetur (prius vno, vel altero die materiæ præparata) ex leuibus pharmacis. Materia autem præparanda incidentibus: vt mulsa, syrupo acetoso simplici, &c. Ex decocto glycyrrhizæ, hordei integri, &c.

Tertio autem die, copiosius humor est vacuandus ex rhabarbari infuso. Deinceps autem humore magis præparato, rhabarbari substantia sumi poterit.

Porro, si materia ventriculum affectat, imprimis vomitus est excitandus: & quieti, ac somno multo, talibus indulgendum: loco obscuro decumbendum: & frequentes acriusculi clysteres iniiciendi.

Ad Soporem.

Soporosi excitandi aëre calefacto, & lucido, corporis agitatione vehementiore, frictione aspera, linteis asperis, & scabro asperso fale, ligaturis dolorificis, pilorum auulsione, clangore, strepitu, odoribus ingratis, & clysteribus valde acris, quibus benedicta, Indum maius, vel

vel trochisci Alandal adiecta sint, cum oleo rutaceo, laurino, &c. Et thymus, pulegium, origanum, & similia calefaciendi, & attenuandi viribus prædita, aceto coquenda: & naribus admouenda: & palatum acribus, vt sinapi, mithridatio, theriaca, &c. illinendum: tandem autem, sternutatoria ex pipere, helleboro albo, &c. naribus sunt inferenda. Atque capiti prius raso, pulueres cephalici, & acriores sunt inspergendi, & affricandi: vt nucis moschatæ, piperis, cardamomi, & si opus est, euphorbii, stercoris murium, &c. Postremo, (re postulante) sinapismus ex pari ficuum, ac sinapios quantitate adhibendus: a quo, ad phænigium ex thapsia, pane porcino, foliis lepidii, &c. est accedendum: atque ex his pustulæ excitatæ pungantur; & humor finatur effluere: & vlcera diu aperta teneantur.

Ad capitis dolorem.

Hic digerentia astringentibus mista sunt applicanda: vt oleum rosaceum cum chamæmelino, vel pannus, rosarum, cha-

mæmeli, anethi, sambuci, decocto intinctus, postque expressus, capiti applicandus: atque tandem mere attenuantium usus esto: vt irrigationum ex decoctis cephalicis: saluia, betonica, libanotide, &c. & ab eis inunctiones ex oleo anethino, costino, & similibus curentur: secundum eas frontale ex cephalica materia, ex foliis saluiæ, melissæ, anthos, betonice, &c. Nisi his cedat remediis capitis dolor, cucurbitulæ cum multa flamma, homoplati, aut ceruicis radicibus applicandæ: partes extremæ fricandæ, & dolorificis vinculis constringendæ.

Ad nauseam atque vomitum.

Purgandus extra paroxysmum humor clystere: & de ventriculo in aluum prouocandus medicamentum diaphæniconis, vel catholicum recipiente: vel eis acriora, si usus exigat: Atque post clysteris usum, ventriculus ex pilulis aloeticis purgandus.

Die sequente, vini absinthitis dimidius cyathus sumendus: vel alia ventriculum

culum astringendo roborantia : vt syrupus de mentha , ex triplici malogranato , & cydonii succo , rosis , & menthæ puluere , aromatizatus.

Hic ad coquendum ventriculi humores pituitosos , somnus , & inedia maximè conueniunt , neque hic omittendæ frictiones , ligaturæ , & hypochondriorum per cucurbitulas suspensiones.

Præparato humore , post alias vacationes , etiam rhabarbarum integrum commanducetur : vel in puluerem redactum syrupo rosarum laxatiuo ad opiatæ formam misceatur : vel mala cydonia , gariophyllis , aut cinnamomo transfixa , & saccharo condita , edenda : vel similiter præparatæ tenellæ nuces iuglandes.

Ad alui fluxum.

Cucurbitulæ ad ventriculi regionem affigantur : & vomitus (si nil dissuadeat) sollicitetur : vel medicamentum catharticum astringens imperetur. Post autem , venter astringentibus foueatur , atq; illinatur , & astringentia cibis præsumantur :

vt

vt cydonium, aromate : cinnamono , gariphyllis, conditum: vel rosarum rubrarum ita præparata conserua.

Ad frigus.

Horum plantis , aliisque partibus , lateres calefacti , aqua vitæ irrorati, & linteis inuoluti admoucantur : qui quàm primum effectum præstiterint, semouendi. Porro spina tota oleo calefaciente, aqua vitæ admista , vel ipsa theriaca vetus infricanda.

Ad cibi fastidium .

Cibi fastidium præcipuè post morbi statum curandum . Ergo intestinis clyster ex vino albo , vel vrina pueri impubis cum multo melle despumato , multo ante cibum iniiciatur , eidem ʒ.i.ß. agari-ci adiecta , & varii cibi apponantur . Si haud ita succedat, clysteres nutrientes iniiciantur : deterfis ante intestinis.

Hactenus febris pituitosa ; sequitur Melancholica .

Melancholica ferè quarto quoquo die
acces-

accessiones habet : 24. horas longas , interdum breuiores.

Raró eundem bis præhendit.

Quartana stata feré pomeridianis tantum temporibus inuadit : & eo contumacior est, quo meridiei propior.

Raró continua est : Autumno solet corripere . Accidit potissimé post 35. annum : & naturis melancholicis , siue diæta, siue consuetudine talibus.

Rigor post initia accidit & in declinatione sudores.

Desinit vrinis, crassis, aliàs albis , aliàs nigris : hæmorrhoidibus, menstruis , vel abscessibus in crura. Initio , id est, 8. primis diebus, tenues sunt vrinæ, & aqueæ : longiore interuallo si quartana intermitat.

Producitur intermittens vltra secundam dierum criticarum periodum : in tertium , vel sextum mensem : aliquando in annum : aliquando in decimum annum.

Quartanæ Melancholicæ æstiuæ, sunt breuissimæ : Autumnales quæ hyemem attingunt longissimæ existunt. Lienino-

cent

cent quartanæ.

Melancholica signa.

Frigus initio abest quod in altum penetrat: vt etiam ossa pertundere vi deatur. Calor hîc minor quàm in pituitosa: & pulsus imbecillior, minor, rarior, tardior, & obscurior.

Remedium.

Melancholica materia bene attenuanda, incidenda, tergendaq; calore temperatis: ad gradum primum excessus.

Febris paroxysmo imminente, ab initio, spinæ, atque scapulæ, inungatur oleo de cucumere asinino, ex euphorbio, &c. tum postea, molli lecto ægrotum bene tectum reponito: & lateres calidos, vino tenui odorato perfusos, & raro linteo conuolutos, plantis, & volis, admo- ueto, & calore succenso, amoueto maturé. Victus attenuans esto: gallinarum, caponum, carnes adultiores, & verueces minores: pulli columbarum, & auiculę nemorales, &c.

Iuscula alterentur boragine, apii foliis,
&

& radicibus, vel eisdem melissophyli, ochymi, adiecto cichorio, oxalyde, endiuia.

Olera refrigerantia asperso piperis, vel zinziberis puluere retundantur.

Vuæ passulæ his conueniunt: & cap-pares sine aceto.

Potus: vinum oligophorum per se: vel hydromel dilutum, ex decima mellis parte ad aquam.

Si suppressa aliqua naturalis purgatio sit, vel ex hæmorrhoides, vel ex vtero, ea excitanda.

Intra 14. vel 20. diem sanguis parcé mittatur ex saluatella si vires infirmæ sint: sin minus, ex interna sinistra: præmisso clystere.

Die phlebotomiam sequente, poterit imperari purgantium aliquod leniter melanophygmum: & ab eo septē, vel octo dies attenuando, incidendo, detergendo, humor præparetur: Ex apozematis hyssopi, maioranæ, melissæ, &c. (nunquam boragine & buglossa omissis) quibus apozematis syrupi conuenientes addantur.

Ab hac humorū præparatione, validius paulo

paulo est purgandum : & ab eo iterum humor præparandus per varias medicamentorum formas : opiatas, tabellas &c. percurrento, usque ad tertiam vel quartam hebdomadam: quo tempore (adhuc morbo persistente) per quatuor dies humore præparato, iterum purgandum: atque deinceps (morbo ad statum accedente) clysterum solummodo usus esto, medicamentorumque alterantium tantum, & humores præparantium . Excretionem facta, vel abscessu, si vires adhuc robustæ sint, catharticum astringens, ut Hamech, vel rhabarbarum integrum exhibendum. Atque postea sudores prouocandi : & urinae : & viscera sympatheticis roboranda, diarhodone, diambra, diamoscho.

Melancholica intermittens : & huius signa.

Primum suboritur pandiculatio, oscitatio, & molesta quædam totius corporis inæqualitas : tum frigoris horror minimè acris : sed velut ossa confringens : & tundens cum articulorum dissolutione. Horrorem sequitur dentium stridor maximus:

mus : interdum binas horas durans.

Cúm ad statum morbus vergit, rigor levis loco horroris suboritur : & horrorem huius febris sequitur calor levis, pulsus initio rarus, tardus : in morbi augmento velox, frequens, sed rarior atque tardior quám in biliosa flaua sincera intermittente. Et in pulsu longe habet velociorem arteriam in principio, & fine motus, quám in medio, Urinæ omnes crudæ sunt.

Paroxysmus tres diei naturalis partes sæpe occupat : non raró ultra 24. horas protenditur. In exiguum sudorem definit : & finito paroxysmo, pulsus impressum febris vestigium continet : rarior, tardiorque existens.

Remedium.

In intermittente melancholica, liberalior cibus concedatur, quám in remittente tantum. Omnia valde humectantia, & magis quám in remittente incidentia, atque calefacientia, tam sumpta, quám admota.

Aër calidior esto, nec diebus inter-

H

missi-

missionis (si vires ferant) negotia consueta intermittantur: & ante ipsum accessum, corpus vehementer exerceatur.

Cibi sint moderati succi: ut panis purissimus, diligenter subactus, probe fermentatus, sale perexiguo, vel potius salis loco, anisi, aut feniculi granis aspersis.

Carnes: hædina, vitulina, pulli gallinacei: iuscula elixorum, carnes assorum.

Æstate conueniunt potissimum pisces saxatiles, ut cancri, & testudines toti, & ex hordei cremore cocti.

Ex fructibus, humidi, nec tamen frigidi: ut poma dulcia cocta, & ex saccharo sumpta, pruna dulcia, caricæ pingues: passulæ exacinatæ, &c. Lac amygdalinum, hordeum ad tabem decoctum.

Iusculis incoquantur borrago, & spinachia, & mercurialis aliquid, si aluus est astricta, atque tempus æstiuum sit. Sin hyemale, mentha, maiorana, melissa, &c. porro diæta omnis esto humectans atque moderate calefaciens. Condiantur nutrimenta omnia aromate pauco, nec valde acri: ut cinnamomo, mace, nucemofchata, croco; nisi caput dissuadeat.

Sal-

Salsamentorum hic vsus maior quàm in prædicta conuenit : sinapios, piperis, &c.

Potus esto vinum generosum, clarum, dulce, dilutum aqua cocta cum aniso, cinnamomo, fœniculo, aut cereuisia eadē arte præparata.

In hac intermittente per initia (virum habita ratione) vberrimè alendum: & somnus longus affectandus.

Alius libera esto: & nisi per initia respondeat, clysteres acriores vsurpentur quàm postea.

Horrori hîc oleo ex castorio, vel euphorbio, &c. consulendum, & sudor copiosissimus eliciendus.

Vomat ægrotus a cibo paulo ante accessionem leni vomitorio, vario prius cibo sumpto: pingui, ac oleoso.

Si sitiat in paroxysmi statu, potus esto syrupus borraginis, violaceus, vel capillorum veneris cum decocto fœniculi, & aqua hordei: & in ipso paroxysmi statu, consulendum viribus aliquo restaurante & pariter sitim leniente: multo magis vbi morbi status vrget.

In hac secetur initio basilica, vel media sinistra, & si niger sanguis fluat, & crassus: satis magno foramine, audacius perfundatur.

Vno, vel altero die post sanguinem missum, purgatio melanaphyga satis fortis paretur: eius tamen siccitate, vel cassia, vel aliquo syrupo humectante refracta.

Deinceps (materia prius preparata) mensibus singulis, nunc hoc, nunc illo modo purgandum lenius: & sumatur catharticum pridie accessionis: aut si accessus tardior fuerit, ipso accessus die.

Postea studendum coctioni, atque humorum præparationi: nunc syrupis, nunc tabellis, nunc opiatis: &c. omnibus magis calefacientibus, & attenuantibus, quam in continua; vt oxymelite squillitico, syrupo de radicibus, de fumaria, de epithymo: singulis dilutis decocto radicum capparum, tamarisci, corticis medianæ fraxini. Atque hæc omnia laxativa fiant ex cartami medulla, senæ foliis, vel agarico; atque tum haustus vnus sumatur quarto quoquo die paroxysmum

mum antecedente.

Porro iuscula pullorum alterentur herbis mollientibus, malua, mercuriali, atriplice, & aromatum aliquo.

Diebus intermissionis poterunt inspergi pulueres diambrae, diamoschi, dulcis, diagalangae &c. omnia pondere maiore quam in continua: & quo propius ad statum, eo calefacientia & attenuantia sint remissiora quam in continua.

A statu, viscera fouenda, ac fotu mollienda: & manifestis signis concoctionis apparentibus, lene purgans ex astringente materia propinetur: & viscera ab eo firmentur: sudores, & vrine moueantur.

Viscera postquam quater aut quinque fota fuerint, molliente vnguento illinantur, & incidente: vt martiato, &c. Cor imprimis hic muniendum, & in ipsis accessibus epithemata ex cardiacis applicanda: & ex eadem materia sicca, scutum assidue extra paroxysmum gestandum.

In morbi statu (lienisi gratia) sanguis

ex salua tella pro viribus, ac morbi ratione, detrahatur.

His peractis, & concoctionis signis apparentibus, balneum valde humectans, & refrigerans minus, imperetur: & ab eo corpus oleo violaceo inungantur, vel amygdalarum dulcium.

Si satis robustus sit ægrotus, poterit ex decocti attenuantis vapore postridie accessionis, bis hebdomade, sudare, præsertim vbi morbum inclinare constiterit: quo tempore theriaca imperari queat, aliquo humectante mista.

Hætenus febres ex bile vnum humorem: sequuntur ex eadem plures accendentes.

Vbi plures accenduntur, spuræ ædici queunt: & ex signis plurium humorum bile accensorum deprehenduntur.

Hæ duplices sunt: vel æquabiliter mistis, atque accensis: vel inæquabiliter.

Vbi æquabiliter miscentur: æquabilis ratio habenda, & præparationis &

vacu-

vacuationis humorum.

Vbi inæquabiliter: inæquabiliter redundantis ratio est maxima habenda.

In pituita siccandum magis: in Melancholia, humectandum.

Hactenus febris ex bile flaua; sequitur ex Atra.

Ex Atra, quarto quoquo die frequentissime corripit.

Signa.

Accessiones a leui rigore incipientes habet, easque Melancholica breuiiores: sed cum mordaci calore, atque siti vehementi.

Sunt item hac febricitantes magis iniquieti quam ex melancholica laborantes, minus tamen diuturna febris est.

Si ex flaua bile vsta oriatur, omnia sunt hinc tantó acriora.

Causa.

Ex prægressis aliis febribus maximè erraticis, ac vagis oriri solet.

Remedium.

In hac omnia humidissima sint, & frigidiuscula tantum: Vinum si cōcedatur, id bene aqua dilutum esto ad vehemētiorem humectationem: aceti tamen v-sus hīc (quod in melancholica negandum) parcus esse poterit:

Somnus esto extra paroxysmum diuturnus.

Sanguinis plus hīc depleatur quā in melancholica: die prima dextra basilica aperta ad ℥. iiii. vel ℥. v. sequenti, & sinistra saluatella, & (si vires ferant) ℥. iii. vel amplius si opus est.

Si atra bilis ex sanguine fuerit, plus deplendum quā si vel ex bile, vel pituita, vel melancholia exusta oriatur.

Purgantia omnia hīc aliquatenus frigida sunt: & bene humida, ex melanaphygo aliquo.

Incidentia haud valde calefaciant: vt oxymel squilliticum, cum syrupo violaceo temperatum, atque dilutum decoctis herbarum mollientium, & valde humectantium: borragine, buglossa, violis

violis &c. Vel potius iuscula carnis salubris vt pulli gallinacei, veruecis iuuenis vel vitalina cum multa borragine, buglossa, & pauca citragine alterata, vsurpada: atque tandem humore epicerafticis temperato, & præparato, blande melanophygyum singulis hebdomadis sumatur.

Morbo tandem declinante, adhibeantur fots, balnea, illitus, mollientia, atque attenuantia omnia, citra insignem calorem: maximè secundum hepatis regionem: præsertim si atra bilis sit sanguinea.

Hic cor toto morbi cursu, epithematis cardiacis muniendum: & tandem, sub finem sudores prouocandi, & vrina: atque vltimò, viscera roboranda.

Hactenus febris schetica: sequitur Hectica.

Hectica febris est quæ in cordis substantia accenditur.

Hec biliosis tantum febribus complicatur. Gradus tres habet: 1. ros conflagratur. 2. gluten. 3. humidum radicale.

H 5

Signa.

Signa. Calor luculentior a cibo, alioquin æquabiliter per corpus diffusus: atque vix febricitanti ob æquabilitatem perceptus. Qui tamen ab alio percipitur acris. Manifestior tamen in volis manuum, & plantis pedum percipitur.

Cause. Raró oritur nisi alio prius morbo prægresso. Interdum diariam febrem excipit frequentius ardentes, atque alias diurnas.

Remedium.

In hectica, humidissima sunt omnia, & moderatè frigida. Aer temperatus habeatur aquæ vaporibus, vel leui flamma: & actior ignis est fugiendus.

Alimentum esto lac muliebre, asininum, caprillum, vaccinum ebutyratum, recens mulctū: vel si muliebre sit, ex ipsa mamma suctum, ab ℥. iii, sensim augiendo, vel etiam a pluribus pro viribus ægroti, donec ad ℥. viii. peruentum sit: plus, minus, prout vires patientis ferant: atque in hac dosi, integrā mensem consistere

sistere ex usu erit. Si forte in ventre
lac acescat, sacchari parum admiscea-
tur: sin vritur, diluatur parum aqua, &
ita sufferuefactum propinetur. Exhibea-
tur autem mané, horis quatuor, vel
amplius a prandio: atque si ex eo pran-
dere velit, mica panis sæpius lota immis-
ceatur.

Ab his postea (viribus ferentibus) a-
staci fluuiatiles, aqua hordei decoquan-
tur, & apponantur esui: item cancri
marini testa exuti, bené loti, & aqua
hordei admodum elixi: ex quibus cum
hordei farina, amygdalis, pineis recen-
tibus, seminibus melonum, atque cu-
curbitæ eisdem mistis inter se, atque po-
stea furno coctis, testudinatum fieri po-
terit.

Porro, his similes cibi reliqui existant:
vt iuscula pulorum alterata lactuca, por-
tulaca, borragine, buglossa, &c.

Potus esto frigidiusculus, atque egeli-
dus, somnus admodum prolixus. Et re-
staurantium destillatorum, colatitio-
rum, expressorum, usus esto frequentis-
simus.

Bal-

Balneum frequenter vsurpetur tepidum, eius vapore prius excepto, tum balneum ipsum, sensim assuefacto. ægroto.

Epithemata partibus principibus accommodentur ex frigidis, humidis, sympatheticis.

Sudor si quis hîc oritur, inhibendas oleis refrigerantibus, & astringentibus leniter inunctis: vt rosaceo, nenupharino, myrtino, &c. Omnia in secundo huius gradu, quàm in primo, diligentius, & verius, vsurpanda.

Symptomata medicum implorantia.

Syncope: aluus astricta: nimis laxa.

Syncopes mitigatio ex præcedentibus petenda. Si aluus profusa sit, (quod sæpiissime accidit in hac febre,) syrupus de rosis siccis, vel myrtinus &c. Diluatur ptisana colata ex hordeo torrefacto, & dilutus propinetur. Et gelatina fantalis aromatizentur: & aceto condiantur.

Si autem aluus astricta sit: clyster refrigerans, & humectans, ex malua, violaria, lactuca, &c. additis oleis refrigerantibus,

bus, violaceo, nenupharino, &c. infundendus.

Tertius Hæcticæ gradus omne remedium respuit atque signum habet faciem ab Hippocrate depictam: oculi caui, nares acutæ, collapsa tempora, frontis cutis arida, aures frigide, atque contractæ, & aurium extremitates auersæ: vngues acuti, & aduncè detorti, &c.

Hæc de cordis dyscrasia calida: atque ita de febribus omnibus: sequitur reliquarum principum dyscrasia.

Ad Capitis dyscrasiam calidam.

Signum.

Æstus cum dolore vehementi.

Remedium.

Moderata lux, alta quies. Fronti, atque temporibus (hæc namque partes in capitis calida dyscrasia laborare solent) panis ex oleo rosaceo inducendus: vel linteorum succo semperuiui, plantaginis, lactu-
cæ, portulacæ, mespillorum, &c. macera-
tum

tum dolenti loco applicandum, & totidem gradibus frigida per omnes meatus applicanda: quæ omnia, siue fasciis, siue anacollematis applicentur, crebro sunt mutanda.

Dolor autem ubi ingens sit, narcotica: opium, & camphora, cum croco ex lacte muliebri inducenda: cautione maxima, ne longius quam dum dolorem sedauerint sinantur.

Sin autem dyscrasia hæc causam habeat feruentem sanguinem (quod ex tensione, grauitate, faciei rubore percipitur) pro usu atque ægrotantis viribus, vena pertundatur: primo cephalica dextera; atque tum postea, vena puppis, vel alterutra iugularium si opus est. Vel cucurbitulæ cum multa flamma, scarificatis ceruicibus affigantur.

Sin verò bilem fouentem causam habeat (quod ex doloris acerbitate pungente, & veluti erodente, absque gauitate, oris amaritudine, faciei pallore, & insomniis percipitur (præmissa parca phlebotomia) cholaphygis potionibus, & clysteribus res transigenda. Atque

que ab his, detonso capillo, topica sunt applicanda.

Porro, si dolor contumax sit, atque pulsatiles: arteriæ in temporibus maxime micantes sunt incidendæ: & sanguis satis largiter fundendus: nec non cucurbitulæ affigendæ, extremorum frictiones adhibendæ: & vincula dolorifica iniicienda. Atque (malo adhuc contumaci) cauterium actuale in medio capite ad futuras adigendum: nec sinapismos, nec dropacismos, pro mali contumacia, prætermittendum.

Sin vero ex ardore mens laborat, vel vigiliæ fatigant: multo diligentius prædicta vsurpanda: atque a narcoticorum, valideque refrigerantium vsu, sensim discutientia cephalica cæteris admiscenda: vt betonica, salvia, libanotis, stœchas, &c. quibus tandem solis vtendum: & animalcula viua per spinam secta, & exenterata, vt catelli, columbi, &c. sunt applicanda.

Hec ad Capitis dyscrasiam calidam.

Ad

*Ad pulmonem calida dyscrasia
laborantem.*

Signa.

Frequens spiritus, atque is exspiratus,
iusto calidior perceptus : lingua ficcior:
malæ solito rubicundiores.

Remedium.

Aër frigidissimus : potio liquidissima,
ac refrigerans, sensim pitissando bibi-
ta. amygdalogala, quatuor seminum
frigidorum maiorum emulsionem ex
hordei decocto. syrupi violacei diluti-
ones : pectoris inunctiones ex hume-
ctantibus, atque refrigerantibus : oleo vi-
olaceo, nenupharino, &c. cum succo re-
frigerante portulacæ, lactucæ, &c.

Ad ventriculum calidum.

Signa.

Appetentia remissa præterquam po-
tionis : cuius ingens existit, a cibis, ru-
ctus nidorosi.

Re-

Remedium.

Cibus liquidus, frigidus, virulentus:
vt pulli ius cum herbis refrigerantibus al-
teratum: maximè sympatheticis: oxali-
de, lactuca, &c.

Potus esto valde dilutus: vel aqua
hordei, decoctum glycyrrhizæ, cum en-
diuia, lactuca, oxalide, &c.

Si bilis in ventriculo ferneat (cuius
signum est oris amaritudo cum rosionis
sensu) cholaphygo est abigenda: Et si os
ventriculi laceffat, vomitu excutienda:
sin fundum petat, ex astringente chola-
phygo, vt rhabarbaro, vel diacydonio la-
xatio est expurganda, a qua expurgata,
epithemata refrigerantia ad ventriculi re-
gionem ante & pene ex succo solani, en-
diuiæ, lactucæ, cum fantalis, aut cāpho-
ra, imponenda; vel cata plasmata refrige-
rantia ex farina hordei cum refrigerante
succo, oleo rosaceo, vel melino addito,
applicanda.

Sumantur autem ante cibum fre-
quentur ribes, oxyacanthæ succus, oxa-
lidis, mali medici, &c. corna, cydonia
&c.

Hepatis dyscrasia calida.

Signa. Sitis contumacior, urinae coloratae, & acriores. Corporis color solito flauior,

Remedium.

Si sanguis ferueat, ex hepatica depleatur: sin bilis aestuat, prius refrigerantibus, atque humectantibus alterata vacuetur.

Omnia intro sumenda sint copia largiore, atque maiore quam in ventriculo laborante. Caetera cum ventriculo conueniunt, si locum, & sympathetica propria excipias.

*Lienis dyscrasia calida.**Signa.*

Proditur communibus signis.

Remedium.

Idem quod iecoris, nisi quod sympathetica propria sint huic accommodanda.

*Renum dyscrasia calida.**Signum.*

Calor molestus circum horum regionem perceptus, & oleosum quid vrinis innatans.

Remedium.

Decubitus in alterutrū latus tantū, & in dorsū vitetur, dormiturus baltheo accingatur cui intexta sint spinacii semina, ne temere dorso noctu incumbat. Lectus esto durus. Quę sumuntur hīc liquidissima sunt omnia: & largiore quātitate quā in hepatis dyscrasia hauriantur.

Sin verō ex ardore renū diabetes oboriatur, vberius & assumpta, & admota applicanda: & quę admota sunt, frequentius immutanda: vt farina hordei cum succo foliorum vitis, plantaginis, portulacę, &c. cataplasmatibus consistentia; & refrigerantia tum, (quibus semper acetum admiscendū) toti ventri inducenda.

Testiculorum dyscrasia calida.

Hęc calore insolito, atque molesto, proditur: & eandem cum renibus therapelam obtinet.

Vteri dyscrasia calida.

Signum.

Fervor, atque dolor.

Remedium.

Loca circum os sacrum, & pubem, decoctis refrigerantibus rigentur: & refrigerantia loco applicentur: ut oui candidum: vel ipsum integrum, cum oleo rosaceo quassatum, & stupa exceptum, &c.

Ad ambusta, Remedium.

Curantur ambusta, vel ipsum ardorem euocantibus: vel extinguentibus.

Euocantia calida sunt: ut ari, aut porri illita folia, cepe sale contusa, & induta: vel oleum cum sale. atque hæc quæcellime sunt inducenda.

Extinguentia, frigida sunt: oxycretum, semperuiui succus, oui album, succus solani, &c.

Hactenus ametria calida: sequitur frigida.

Signa.

Pars tactu frigidior percepta: excrementa

menta cruda, & multa : pallor (si partium
externarum aliqua sit) : & decoloratio.

Causæ.

Primæ, & procatarctica: Exercitatio-
nes intermissæ : tristitia : curæ, &c. Venus
prodiga : in mulieribus menstrua nimi-
um fluentia. somnus nimius : Aër im-
pense frigidus, cibus, vel potio nimium
refrigerantes.

Internæ causæ, frigida cacochymia:
interdum ex pituita : interdum ex me-
lancholia.

Remedium.

Diæta calida, & calefaciens. Exerci-
tatio pro corporis viribus satis valida. ha-
bitus fricandus, & a balneo attenuante,
calidus vngendus. Hilaritas procuretur:
etiam interdum ira excitanda.

Cibus calidus, panis triticeus, modi-
ce fermentatus, sale aniso, &c. consper-
sus.

Carnes salubritum animalium, & con-
coctu faciles : veruecinæ vitulinæ, pullo-

rum gallinarum, pisces saxatiles, atque omnia aromate condita.

Potus meracus, olera acria; cepe, porrum, &c.

Medicamentum ex tribus piperibus, ex vino, certis interuallis sumatur: vel aliquid electuvariorum aromaticorum vel puluerum diagalangæ, diamoschi, &c.

Cordis dyscrasia frigida.

Signa.

Respiratio parua, & pulsus paruus: metus: tristitia.

Remedium.

Corpus exercendum; hilaritas procuranda. Dieta reliqua esto aromatica. Potus vinum satis generosum. Medicamenta exhilarantia cardiaca: vt diamoschi, aromaticum rosatum: lætificans Galeni, & ex eadem materia stillatitia aqua rosarum, melissæ, vel ochymi admista, epithemata aptentur: atq; ex eisdem siccis scuta ad cordis regionem gestanda concinnentur.

Cere-

Cerebrum frigidum.

Signum: Sensus perceptio frigida.

Remedium: Cephalica vberius quam in prophylactica adhibita.

Pulmo frigidus.

Conuenit cum corde frigido, si locum & sympathetica excipias.

Ventriculus frigidus.

Signa.

Tarda coctio: ructus acidus.

Remedium.

Si humore pituitoso fota sit: (quod ex grauitate quadam, & nausea, & ex ventriculi dissolutione, & languore, percipitur) ipse humor medicamento aloetico vt hiera pichra, pilulis stomachicis, &c. est expurgandus, vel prius attenuatus (cæteris consentientibus) excutiendus: & postea ventriculus sympatheticis calidis corrigendus: sumpto vel diaspolitico, vel diatrion piperon, &c. & fomētis, ac sacculis ex stomachica materia, vino aromatico ga-

riophyllis, nucemofchata, absinthio roborandus.

Cibus esto siccus ex volatiliū carnibus, cinnamomo, gariophyllis, &c. transfixis.

Potio esto parca, & meraca. Cibus actu calidus, potus frigidus.

Sub finem autem (expurgato humore) astringentia vsurpentur: præsertim si inde diarrhæa lenterica immineat: tum namque astringentia vel toti ventri sunt inducenda.

Hepar frigidum.

Signa.

Color faciei pallidus: Vrina alba, aliās tenuis, aliās crassa: attractrix facultas, vel alteratrix, vel ambæ infirmæ.

Si attractrix vis infirma sit: liquida, cruda, incocta per aluum excernuntur: ad chyli tamen formam accedentia.

Si alteratrix tantum infirma sit: simile quid loturæ carniū, vel sanguinis aqua diluti, ex interuallis excernitur.

Remedium.

Cibi calefacientes: mel, passulæ, ficus, amyg-

amygdalæ, pistachia, &c. Potio: vinum.
Ex pharmacis: Electuarium ex vino chyp-
hondes, dictū, vel mel passulatum cum
cinnamomo, cassia, spica, ligno, aloes, &
croco. sumatur ʒ. ss. ex vino odorifero.

Euparatorium, absinthium, schænan-
thus, ex vino, & aqua cum melle cocta,
frequenter vsurpanda.

Foris autem illinantur oleum irinum,
mastichinum, costinum, &c.

Si quis autem humor ametriam pariat,
est is primum pharmaco expediendus:
atq; deinde cætera sedulo vsurpanda.

Lien frigidus.

Conuenit cum iecore: si locum, &
sympathetica propria excipias.

Renes frigidi.

Testes.

Vterus.

Calidis sympatheticis imprimis, secū-
dum naturales aditus applicatis curantur.

Ad partem frigore lesam.

Remedium.

Pars sensim calefiat, & (perfrigerato loco callidiorē collocato) pars ipsa oleo irino, costino, e castorio, vel euphorbio inungatur: & lana succida inuoluatur: nunquam omissis parti sympatheticis.

Hactenus dyscrasia frigida: sequitur humida.

Signa.

Pars nimis mollis, & humiditate diffuens: Excrementa copiosa, facilis sudor.

Causa.

Procatactica: vita sedentaria, somnolentia, aer, & habitatio humida, iuscula crebra, cibi humidi, potio multa.

Internæ: Excrementa, vel succi humidi copiosi: serosi humores redundantes.

Remedium.

Siccantia omnia: Exercitatio valida, sudores multi, frictiones siccae, & hypocausta.

Cibus assus: & ex animalibus siccis, sal-famenta, panis siccus, & vetustus: modo haud

haud nimium induruerit. Iuscula nulla.
Potus parcus. Venus.

Cor humidum.

Cerebrum.

Iecur.

Ventriculus.

Lien, &c.

Omnia siccantibus, sympatheticis, &
roborantibus sunt corrigenda.

*Hactenus discrasia humida : sequitur
sicca.*

**Hæc difficilius quam humida cedit
remediis.**

Signa.

**Pas durior, squalidior, excrementa
pauca.**

Causa.

**Procatartica: studia, vigiliae, curæ,
labor vehemens, & exercitatio vehe-
mentior, & laboriosa. Venus prodiga.**

**Aër ficcus Laconica multa. Cibus
ficcus. Potio parca. Interna: sanguis
parcus.**

Remedium.

Remedium.

Humida omnia exercitato lenta, & parca: iuscula crebra, lac, iuscula hordeo, borragine, buglossa alterata. Balnea ex hydrelæo: & ex hidrelæo frictiones. Hilaritas. Somnus etiam à cibo brevis. Potio diluta, & vinum oligophorum.

Siccitas marasmodēs (exhausto humido radicali) omnem therapeiam respuit.

Partium principum sicca dyscrasia.

Harum, atque reliquarum omnium siccitas, ex vberissime adhibitis quæ in prophylactica dicta sunt, est corrigenda.

Hactenus quarundam partium elementaris dyscrasia.

Si vniuersalis dyscrasia sit: per omnes vndique aditus est abigenda: exordio ab illa parte ducto quæ alteri incommodat.

Causas habet vel vndique afficientes, vel principes: & signis prædictis vndique

que manifestis proditur.

Hactenus ametria Elementaria: sequitur venenata.

Venenata ametria est, omnium eucrasiae partium a venenata causa corruptio.

Venenata ametria est alexiteriis demolienda.

Venenata duplex § In corpore genito existit: ex veneno § Vel extraneo.

In corpore § Spiritus tantum inficiens: genitum est § Vel substantiam corporis, duplex: vel item corrumpens.

Spiritus inficiens; fere vel cerebri, vel cordis, tantum spiritus inuadit: idque pro veneni motu, vel seorsum, vel simul.

Cerebri spiritus seorsum inficiens epilepsiam parit.

Est autem epilepsia, convulsorius vniuersi corporis motus: ab aura venenata, in qua de repente ægroti cōcidunt: & ex interuallis conuellantur; & interdum voce nil significante exclamant: & ore spumam

spumam edunt. Aliquibus vesica, & al-
uius, inuoluntarié soluuntur: aliis adultis,
genitura excernitur.

Pueros vexare solet septimestres, iam
dentientes: & interlunio natos: & matris
menstruis fluentibus conceptos: atque
tum perseuerare solet ad pubertatis an-
nos: quibus cum primum semen mares
emittunt, & menstrua femellis effluunt,
cessare solet: quos si superet annos, dif-
ficile curatur: & fere desperata res est.
Atque alias ubi stertor, stridor dentium,
partium faciei peruersio, corporis to-
tius iactatio vehemens, spuma multa,
seminis effusio, in ipso casu acclama-
tio, res periculi plena existit.

Remedium.

Corpus loco lucido collocandum, ex
temperatè calido: capite sublimiore: ex
quo, membra supernè, deorsum fricen-
tur: clystere fatis acri prius iniecto. An-
te omnia os diducendum est: atque re-
nendum diductum: & lingua, & palatū,
theriaca, & mithridatio, vel alterutro,
rutæ succo, vel oximelite squillitico dis-
soluto

soluto illinenda : & naribus excipiat
 fumus belzoini : vel castorium odoran-
 dum : vel castorium , atque belzoinum
 oxymelite squillitico dissoluta in gulam
 indantur : in aures , & nares , oleum ros-
 marini , aut nucis moschatae infundatur :
 & iisdem coronalis sutura , & lambdoi-
 des , fricentur ; & extremis vincula do-
 lorifica iniiciantur.

Hac arte excitato epileptico , reuulsi-
 onibus studendum : & vacuationibus ab
 ipso cerebro : primum clysteriis ; tum pur-
 gantibus : praesertim per sedem , ex hiera-
 diacolococythidos : deinde cucurbitulae ,
 cum scarificatione affigendae , pro aegro-
 tiviribus , ac morbi vehementia . Ex in-
 teruallis (aegroto interea recreato) , cu-
 curbitulae primum hypochondriis affi-
 gantur : deinde scapulis , cum scarifica-
 tione : atque (diebus interiectis purgato
 corpore & aegroto recreato) occipitio af-
 figantur : & rubrificantia , & vesicas exci-
 tata , collo iuxta scapulas , admouenda , de-
 niq; cetones , & cauteria , extremo occipi-
 ti , & carnes brachii parti inducenda : aper-
 to diu seruatO vlcere : caput radendū : vel
 deton-

detondendum: & cucupha ex cephalicis adiectis morbo antipatheticis, vt visco querno, pœoniæ maris radice, hyssopo &c. gestanda: & sternutatoriis ex pipere, euphorbio, sinapi &c. vtendum, & apophlegmatismis. Atque tota therapeiæ historia, antidotus sumatur huic malo proprius: vt squilla apud Galen. in consilio pro puero epileptico: vel aliud quodlibet accommodatum ex visco querno, radice, & semine pœoniæ maris, decreſcente Luna collecto: cranio humano: vngula asini: cornu alcis, &c. Quibus autem inueterata est, malleoli venæ, veris initio, incidendæ.

- Si infans sit, nutrix esto abstemia: & coitu abstineat.

- Pueri corpus molliter fricandum: & caput detonsum, inungendum oleo anethino, rutaceo, sampſuchino, &c. puluere cyperis, angelicæ, radicis pœoniæ maris adiecto. Alius semper tenenda tenera ex butyro, & saccharo, vel melle nutricis mamme illito: mercurialis cauliculo in anum inserto: vel aliquid syrupi laxatiui rosarum pallidarum pulciculæ
misce-

misceatur: vel sedes melle illinatur, & rutæ succo: vel salis grumus in podicem indatur.

Si aliunde venenum deferatur: tum & origini est obstandum. Quæ ex sanie maligna biliosa in ventriculum irruente ieiuno feré, oriri solet. Hic ergo panis vino tenui austero, vel granatorum succo macerandus, atque sumendus: atque ventriculus ex aloetico medicamento purgandus: vel vomitu humor vacuandus: & ne talem saniem admittat, symphatheticis astringentibus roborandus. Pueris solet ex vermibus putrentibus accidere. His, amaris, & alexiteriis, vermes enecandi, atque eiiciendi, tam sumptis, quàm ad vmbilici regionem applicatis. Atque detur (luna declinante) semen pœoniæ cum puluere contra vermes, bis hebdomade.

Si ex alia particula quæ constringi poterit malum oriatur, fune diligenter excipiatur: & pars arctissimè cōstringatur, vt præcludatur veneno aditus: & particulæ, rubrificans, & vesicans medicamentum, imponatur: vt lepidum; sinapi, cantharides,

tharides, &c. Cucurbitulæ loco affigantur, & mithridatio, vel theriaca, vel anagallide rubra, locus inducendus & vicinia omnis ex sinapi pipere euphorbio cum melle anacardino, vel theriaca. Si locus præligari nequit, saltē cucurbitulę adhibeantur cum scarificatione, & multa flāma.

Vbi cor venenū petit, idque vehementius: lipothymiam, aut syncopem parit, vbi remissius palpitationem. Id autem ferē accidit ex sanguinis grumo in ventriculo, vel intestinis, vel in pectore, vel in vesica, putrescente: vel ex vermibus putrefactis, vel vomica subitō rupta; ac virus in cor exhalāte. Hīc primum ex syncope reuocandus ægrotus vino porrecto, & odoratis astringētibus naribus adhibitis, & spiritus recreantibus, vt aceto rosaceo in quo hyssopus maduerit, vel ipsa hyssopi coma intincta, & odorata: & frictiones adhibendæ partibus extremis: & vincula dolorifica iniicienda. Atque deinceps, (reuocato ægroto) grumus, & venenum, expurgandum: & Cor sympatheticis, & antidotis, tam sumptis, quām admotis muniendū: vt
diar-

diarmargarito frigido, puluere de gemmis, quæ sumi poterunt ex syrupo de acetositate citri, & aqua rosacea dissoluta pannis intinctis, ad regionem cordis pro epithematis applicari &c. Nec non vtile theriacam cum conserua borraginis sumere. Denique cor vndique muniendum, & sibi sympatheticis: atque antipatheticis veneno; eademque ratio in palpitatione ex aura venenata est tenenda. Atque hæc vbi seorsim petuntur: veneno simul autem, & cerebrum, & cor, in vteri suffocatione affici solent. Ergo in hac, cum accessio propinqua est: torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus tristis: cum iam instat, strangulatus, grauis sopor premit: mens desipit: sensus torpent: vox obmutescit: crura contrahuntur: Deinde maxillæ rubere incipiunt: facies aliquantulum ardescit: pulsus exiguus, languidus, in nonnullis vix perceptibilis. Cum remittit, humiditas quedam ad tactum ex locis muliebribus procedit: atque tandem redeunt ad se.

Circuitibus mouetur: hyeme & autū-

no magis. accidit iuueniculis, ad venerem procliuiibus: sterilibus maximé, si ex medicina sumpta fuerint infecundę: & eis quę præter consuetudinem non miscentur viris.

Causa.

Vapor in principes partes elatus ex femine corrupto; vel alio quouis humore crasso, & veluti seminali in vtero putrescente: & in partes nobiles virus exhalante.

Remedium.

Excitetur e paroxismo vellicatis auribus, maximé pilis pudendo adnatis. Aliquādo opus & piper, zinziber, sal gemmæ, & huiusmodi alia pudendis immittere. Inaccessione, summa diligentia & crura tota: & corpus totum perfricandū, ex aceto, & sale. Odore foeda naribus admoveātur: vt castoreum, galbanum, alliū, pili combusti, veteramenta combusti, & naribus excepta. In vuluam autem odoratissima vnguenta infundenda, vt oleum, ciueta, vel moscho, mistum: vel in
quo

quo nux moschata , cariophyllum, &c: incoxerint : vel pulueres aromatici miscetur . Et inde obstetrix (intincto digito) affricet os vteri , in virginibus : in aliis interiora.

Porro sternutamenta fiant ex castorio , pipere , elleboro, sinapi &c. Cucurbitulæ affigantur inguinibus , & ventri, cum multa flamma : & voce aspera exitetur , vbi accessio conquieuerit : vomitus excitandus , & cibus parcus offerendus, vel nullus : & cardiacis roboretur.

His per interualla , castorium ʒ.i. pondere vel ʒ.ii. bibendum ex artemisiæ decocto : vel bryoniæ radix , vino albo incocta .

Si virgines sint, vel viduæ , nubant : si nuptæ ; coitus frequentior esto solito.

Si prægnans laborat suffocatione , ea quæ conceptum corrumpunt cauenda : & quæ vehementer vterum concutiunt.

Haftenus de veneno spiritus tantum insufficiente: sequitur corporis item substantiam corrumpens, atque primum de Elephantiasi.

Signa.

Pili Elephantiacis defluunt: & vbi auelluntur, cutis pars vna sequitur: tubercula rotūda, multa, granosa, sub superciliis, & pone aures, variisq; faciei locis: Auricularum contractior & exactior rotunditas: frontis rugositas: oculorum obtutus fixus, & exacta rotunditas: nares extrinsecus patulæ: intrinsecus constrictæ: labrorum sublatio, crassities, & tumor: gingivarū sordes: foetor: erosio. Venæ sub lingua varicosæ, & nigre: animæ foetor: vox clāgosa, & ex naribus manās. Vniuersæ cutis defædatio cum arida scabritie, cum multis herpetibus, scabie, & vlceribus, squamas, crustasque remittentibus: sensus compunctionis per vniuersam cutem: consumptio musculorum inter pollicem, & indicem: scapulæ instar alarum extantes: partiū stupor, partiū extremarū putredo: terrifica insomnia: timores: ad coitum furentes: sanguis si aqua dissoluatur, arenosus: pulsus debilis: vrina istar iumentorū crassa.

Remedium.

Malum si inueterauerit, incurabile existit.

existit. ubi recens sit; (id est cum nihil ex summis deciderit: nec vlla sit vlceratio, nec eminentiæ tuberosæ plurimum exurgant: sola facies aspectu ingrator, neque tamen admodum indecora:) therapeia experiunda, quantumuis difficilis.

A somno, manu molliter permulceantur: aluoque deiecta prius, gestetur: & vocem exerceat: deinde perfricetur, & vario exercitationū genere vtatur. Sudor ab exercitatione cōtractus abstergeatur; & corpus butyro recenti delineatur: & post (tempore pauxillo interposito) succo foenigræci, aut ptisanæ cremore corpus perungatur in balneo: & a balneo deterfus, perūgatur oleo myrtino, vinoque modico, cū alumine, vel ammoniaco, vt sordiu sit spissitudo: rursus teneris panniculis absterfus, dimidia hora cōquiescat; inde potu aquæ ad vomitum sollicitetur; post vomitum detur vinum absinthites, aut organites.

Cibus: Panis hordeaceus, vel maza, ptisana, oua, lac, mel cum pane, pisces molli carne præditi, saxatiles: ex testaceis: ostrea, pectines, tellinæ cū betis incoctæ.

Volatilia boni succi.

Ex oleribus : beta, lactuca, malua, rumex: &c.

Ex fructibus : ficus, vuę, passulæ, pinci nuclei, amygdala &c.

Vino, ac venere, toto morbi curriculo abstinendum.

Leui adhuc malo, caput vrendum feramentis nuclei modo rotundis : capite ad cutem prius detonso, quinque crustis excitatis : vna supra sinciput, altera paulo supra frontem vbi pili desinunt, tertia in occipitio : duabus reliquis supra ossa squamosa : vlceribus diu apertis seruatis.

Quo nisi cedat malum, atque valentius sit : protinus per initia sanguis mittatur. præsertim vere, pro viribus, ac vsu, ex utroque brachio, ampla vena, si ferant vires; sin minus, ex malleolis, vel manu extrema, ac nouem diebus, vel decem interpositis : purgetur corpus hiera diacolocynthidos : non semel; sed (habita viri-um ratione) frequentius, atque aliis decem diebus interpositis, lactis scissilis ferum detur, haud minus tribus heminis, nec amplius quinque : sequēte tempore,
recens

recens multum bibi poterit: & frequenter vsurpari.

Si morbus haud quaquam cedat: lacte abstinendum, & vomitus tentandus ex radícula: atque postea ad helleborum album accedendum: bis vere, (si fieri potest) semel per autumnum, & metasyn-
criticis vtendum ex alto humorum rapi-
entibus: & leues cucurbitulæ hypochō-
driis, & ori ventriculi applicentur: &
membra dropaci illinantur; atque iterū
ex interuallo corpus purgandum ex hie-
ra: & sanguinis tum missio prætermi-
tenda: atque hoc ter in anno repetendū:
vere potissimum, & autumnō.

Inter dies purgationis, vtendum fre-
quentibus balneis, & antidotis: balneis
ex fumaria, borragine, buglossa, nepeta,
&c, & smegmatis in balneo vtendum,
ex rumicis radice, sulphure, nitro, & tu-
midis eminentiis, iberidis viridis folia,
cum axungia tusa, applicentur.

Ad spirandi difficultatem: qua ele-
phantiaci affligi solent: aselli sub aquariis
degentes, quinque aut sex, ex aquæ mul-
sæ cyathis tribus potentur.

Antidotus autem sint, decoctum brassicae, absynthii, ligni sancti, cum passulis, ficibus, violarum floribus, & boraginis, ac buglossi foliis, erinacei caput eodem modo decoctum.

Viperarum carnes, abscisso capite, & cauda, ad putrilaginem coctae: carnibus affis, & iusculo absorpto. theriaca ipsa, tum pota, tum illita: & sales theriaci.

Atque hac potius ne morbus inualescat: quam ut omnino curetur.

Cancer.

Signa.

Durities partis: color liuidus. i. inter rubrum, & nigrum medius: circa locum affectum ictus, quasi punctim illati sentiuntur: interdum torpet: venas ostendit in circuitu tumentes, ac elatas, canceri brachiorum modo. vbi exulceratur pars, dolet; labra prætumida habet, aspectu horrida, & colluie ingrata, fanies continué manat tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, & grauius olens.

Re-

Remedium.

Est item fere & istud malum immedicabile, estque vel mitigandum, vel prorsus excidendum: si in eis partibus sit quæ incidi poterunt, mitigatur primum sanguinis missione: tum alios humores purgante pharmacho ex intervallo. dieta esto ex ptissanæ cremore, lactis sero, piscibus saxatilibus, omnis generis auiculis, exceptis palustribus.

Ex oleribus conueniunt malua, atriplex, blitum, cucurbita, &c. acria vitentur omnia: & potus generosus, menses, & hæmorroides, consuetis irritentur: & linteum molle duplicatum succo solani imbuatur, & applicetur, &c. lanam molliusculam extrinsecus eodem succo madentem linteo circumdato: & ne siccescant, hæc eo succo subinde irrigato, vel applicetur vnguentum album vnguentum életharguro, & plūbo vsto: ex pompholige, &c.

Atque hac mitigandi ratio.

Vbi autē excindere libet, prorsus rescindendus, vt nulla radix supersit: & sanguis exprimendus; & sinendus fluere. etiam exciso

exciso cancro, candente ferro locus inu-
rendus: vel si minus libet secare, & can-
dente cauterio adurere: Exedatur carci-
noma arsenico sublimato: quod triduo fi-
nendum vel dum effectum præstiterit,
quod ex loci tumore percipitur. Interea
vicinis partibus bolo, oleo rosaceo, suc-
co solani, plantaginis, semperuiui: muni-
tis, dolor mitigandus malua, althæa, in
mulso subacta, & oleo rosaceo pauco ad-
misto, ad cataplasmatismatis formam.

Carbunculus.

Signa.

Pars dura, ardore feruens, pustulæ sæ-
pe multæ, exiles, milii magnitudine: in-
terdum vna maiuscula, ab eis crustosa vl-
cuscula qualia ferramentis candētibus ex-
citantur, crusta modo cinereum colorē,
modo nigrorem, præ se fert; eoque loco,
leuari cutis nequit: sed carni inferiori
quasi infixæ est, circumiacens caro in-
flammatu ingenti ardore, & colore ni-
grescente, splendetque bituminis, & pi-
cis, modo. His accidit febris, nausea, fre-
quens

quens vomitus, appetitus prostratio, cordis tremor, palpitatio, & frequens animi defectio.

Remedium.

Cordi imprimis hic consulendū antidotis, & alexiteriis sumptis, & admotis, sympatheticis, & veneno repurgantibus, diamargar frigido, de gemmis, puluere bezardico, &c. Sanguis (si vires ferant) ad lypothimiam mittatur: ac deinde tumor scarificandus plagis altis: & ipsæ incisiones, aqua calente statim perfundendæ: interdum & opus est arsenicum sublimatum imponere: vel sanguisugæ affigendæ, & vicinæ partes muniendæ bolo, succo solani, cum rosaceo, &c. & malum punicum acidū in aceto coquatur ad tabem: tum deteratur ad leuorem, & parti laboranti, & circumiacenti imponatur, & recondita facultate præditum sequens pulicula applicetur: succorū symphiti maioris, scabiosæ pedis columbini, an. ʒ. ii. farinæ hordei ʒ. iii. misce. Quidquid carnis emortuæ fuerit, radicitus extirpandū: quod nisi succedat, inurendum ferro candenti, dum omni ex parte sensus doloris sit;

fit; & crusta laxanda, vel si vri recuset, adhibeatur plebeus quis: qui carbonem mordicus apprehensum radicitus euellat.

Porro diæta esto tota acida: vt pruna acida, oxalis in iusculis: & aceti, mali punici, & aranciorum, atq; omphacii condimenta.

Ad Gangrenam.

Signa.

Color partis liuidus, fuscus, arteriarum motus in parte insensibilis, putredo, ac factor: pressa pars digitis cedit: atque etiam apparet cutis a parte semota.

Remedium.

Gangræna quamprimum excidenda: quanquam pars aliquem sensum obtineat. Cor roborandum theriaca ex aqua cardui benedicti, angelicę; &c. Et epithemata ex sympatheticis cordi imponantur: atque veneni vim retundentibus, fantalis, corallo, rosis, theriaca, mithridatio, &c. Pars ipsa scarificanda, vel vbi opus est, ad ossa vitæ vasis, nisi & ipsa putre-

truerint, incidenda: & pars aqua salsa lauanda in qua ægyptiacum, & aloë bullierint: sub finem addita aqua vitæ. post lotionem, ægyptiacum imponendum, & ægyptiaco aliud emplastrum loca vicina complectens, putredini resistens ex fabarum farina, hordei, orobi, lupinorum, &c. cum aloë, myrrha, mastiche, aqua vitæ, & oxymelite exceptis. Interea partes circumiacentes muniendæ repellente, atq; astringente materia: succo plantaginis, solani, semperuiui, cum oleo rosaceo, bolo armena, oxyacantha, &c. Atque sæpe repetenda remedia hæc, quæ nisi fructum præstiterint, cauterio pars vrenda, & ab eo, porri succus, cum sale trito atq; dissoluto apponendus.

Quòd si nec cauteria proficiant, pars (si præscindi poterit) est ex amputanda prorsus: potius ex sana parte aliquo exciso, quàm ex ægra relictæ.

Hætenus venenum genitum, sequitur extraneum.

Extra-

Extraneum est { Intro sumptum:
 Vel { Foris exceptum.

Intro sumptum est { Spiritu raptum.
 duplex: vel { Potum, vel æstum.

Spiritu raptum, vt pestis.

Signa.

Rapto per inspirationem veneno, continuo per pulmones cor petit, & labefactat: huius, arteriarumque spiritus, atque interdum humores, & vniuersum corpus inquinat. Vires omnes vitales quamprimum infringuntur, & squalent spiritus. hinc pulsus arteriarum exilior, imbecillior, frequentior, celerior, quæ argumenta sunt pestis acutissima, quæ vno die hominē rapit. In hac nec ardor mordax, nec sitis vehemens, vt nec laborans sibi febrecitare videtur: nec in vrinis, quid alieni apparet: sed syncope, pulsu paruo, ac presso, vel assidua vomitione, vel vigiliis, iactatione corporis, viriūq; prostratione proditur: nullus item sensus doloris percipitur.

Si vna & humores corrumpuntur mitior

tior pestis est sine carbunculo : Carbunculo sociata grauior. Atque in his minus grauis, si bubo apparet ante ægroti decubitus.

Remedium.

Vbi corpus plethoricum est, ad diminuendum hanc, sanguis mittendus audacter: & frictionibus (pro ægroti viribus) & vigiliis, venenum euocandum, & leuibus pharmacis & clysteriis.

Cor muniendum antidotis: tormentilla, betonica, morsu diaboli, scabiosa, vel electuaria ex bolo, vel theriaca, cum oxalydis stillitica, &c.

Aëris fiat frequens mutatio, & temperatus sit.

Alius quotidie ducatur clysteribus blandis & catharticiis mollibus.

Cor epithematis muniatur ex aqua rosarum, violarum, &c. cum santalis, camphora, vel puluere bezoardico, N. præpositi. & subinde repetenda alexiteria: & vires, & cor recreanda diamargaritone, diarrhodo, &c.

Cibus esto leuis, & acidis conditus.

L

Bubo

Bubo si proruperit, conandum pro viribus foras euocare, cucurbitulis, cum scarificatione: sanguisugis, cauteriis si vires ferant, catellis dissectis, & applicatis, vel attrahentibus pharmacis: ut in cepa incocta theriaca, vel scabiosa, lysmachia. Vomica aperta, sinatur die vna, ut virus expiret.

Si pestis mitior sit, erumpunt bubonis loco, exanthemata, morbilli, varriolę, atque in his, præstat febriculam præcedere quam sequi. plures hinc deteriores, paucioribus; maiores, minoribus. malę pruriginosę, ardentes, & quas vomitus comitatur frequens, & alui fluor. item quę intro redeunt, sunt pernicipiei plenissimę: nisi aluius fluat, & colluuiem expurget, solent apparere, primo, secundo, aut tertio post febrē die: melius cito apparere, celeriter augeri & maturari: atque ferē ad diem 7. maturantur.

Exanthematis & iethymatis magis obnoxii sunt pueri, ob corporis teneritatē: nec viris accidunt, nisi constitutio aëris valde grauis fuerit. Ex his autumnales grauissimę sunt. In his initio raptō veneno,

no, vniuersum corpus, maximé caput ingrauescit, dolore plerumq; concutitur, oculi tument, & illachrimantur: facies quasi inflammata rubescit: raucescat vox, spiritus crebrior, ac difficilior euadit: pulsus frequens, ac celer, & malo ingrauescente, proditur in cute. Ecchymata pustulis multis, toto corpore, confertim albo colore, extuberant: pituitæ, ac bilis mistionem præ se ferentes. Exanthemata quasi pulicum maculæ; feré rubra apparent: interdū purpurea, interdū viridia aut nigra.

Remedium.

Postquam eruperint, parcendū somno, atque tum diaphoreticis, & sudorificis vtendum: Ex decocto fæniculi, caricarum vel ficuum, semine apii, &c. cum sirupo acetoso simplici.

Haftenus inspiratum venenum: sequitur potum vel æstum.

Ad venenum sumptum.

Actutū ex hydrelæo vomendū calente; vel oleū aut eius loco butyrū, ex decocto

feminum lini, maluę, fenigręci, bibendū.

Atque post, clyster paulo acrior, infundendus ad intestina purganda: & ab his, lac copiose potandum: & antydotus veneno repurgans sumenda larga quantitate: vt terra lemnia, marubii succus, betonię folia, & prę cęteris theriaca vel mithridatum. 3.i. vel ii. pondere, vel bis etiam die.

Venena sumpta sunt vel ex	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; line-height: 1;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Animalibus aut horum o- peribus:</p> <p>vel in anima- tis, eisq; vel</p> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; line-height: 1;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Vegetabilibus Metallicis.</p> </div>
---------------------------------	--

*Ad animalia venenata: Atque primum
ad Cantharides. Signa.*

A Cantharide sumpto: a stomacho ad vesicam, cuncta morderi sentiuntur: & gustum similem pici, aut cedrino liquori habent. Dextra hypochondria inflāmantur: Vrina difficulter redditur, & sæpę vna sanguis exit: & per aluum excernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent: animo linquntur, anguntur,
verti-

vertiginibus laborant: tandem mente alienantur.

Remedium.

Hic oleum rosaceum potandum ex hordei cremore: & frequentes post vomitum clysteres ex cremore hordei, orizæ, cum semine feniculi, & maluis. In vesicam itē fundenda emulsio seminum frigidorum maiorum, cum decocto hordei: & balneum aquæ dulcis imperandum.

Ad Buprestem. Signa.

Bupresti sumpto, gustus virosus offendit vehementer, stomachus, & venter dolent, & instar hydropicorum tument: extima corporis cutis intenditur, vrina suppressitur.

Remedium.

Post vacuationes, detur decoctum ficuum aridarum ex vino, & remittente malo, iuuabit & palmulas, & ex omni genere pirorum edere.

Salamandra. Signa.

Lingua inflammatur, mens impeditur,

tremor cum torpore quodā, & resolutione vrget; partes quędam corporis in orbē liuoribus variantur; & subinde permanente veneno, putrefactę defluunt.

Remedium.

His conuenit resinam e pinu, aut e picea sumere: vel galbanum cum melle, & nucleos pineos, cum decocto chamępitęos, vel ranarum ius, cum decocta eryngii radice sumere.

Pinorum erucca. Signa.

Oris palatiq; dolor, valida linguę inflammatio, stomachi intestinorumque cruciatus, quę cum pruritu circumtendi sentiuntur: feruor toto corpore affligit, & stomachi fastidium vrget.

Remedium.

His oleum melinum sumendum: & clystere excipiendum.

Lepus Marinus. Signa.

Gustus piscibus virosis haud absimilis: temporis progressu, aluus indoles, vrina
sup.

supprimitur, & si quando eruperit, purpurei coloris cernitur. Auerfantur pisces omnes; præter fluuiatiles cancos: sudor foetidus erumpit, & vomitus biliosus, & nonnunquam sanguine mixtus.

Remedium.

His sumendum continué lac asininum: aut passum, aut sanguis recens, & calens anseris, aut cyclamini radix trita ex vino propinanda.

Rana rubeta, & palustris. Signa.

Corporis tumor, pallor intensus buxo similis: ægré spiritus trahitur: os foetet, singultus infestat: & semen aliquando inuoluntarié prorumpit.

Remedium.

His multum meraci vini sumendum: item arundinis radicis, vel ciperi. 3. ii.

Porro cogendi sunt celeriter ambulare, & currere: & calida quotidie lauandi sunt.

Cameleon. Signa.

Valida ventris erosio; dolor cum totius corporis peruersione, tremor, mox conuulsio, item vomitiones spumantes, & pituitosæ: quibusdam singultus: vox nihil sonat, facies distorquetur.

Remedium.

Pinguis tritici cremor calidus epotus, absinthii potio: nitrum cum oxymelite, vel radicula: præcordiorum fots: terebinthina, styrax, semen vrticæ, folia cupressi, sumpta.

Cerebrum felis. Signa.

Vertigines crebræ, stoliditas: amētia.

Remedium.

Potent moschi ꝑ℞. ex vino, vel diamoschi sumant ꝓ.i. quatuor horis ante cibum: mane, ex vino, certos dies, dum malum cedat.

Hactenus venena ex Animalibus: sequuntur ex vegetabilibus.

Altercum. Signa.

Mentis

Mentis alienatio, ebriorum more.

Remedium.

Conquiescendum his: & mulsa, vel lac asininum: & ficuum siccarum decoctum bibere his vtile.

Porro cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepæ, allia singula cum vino sumpta, plurimum conferunt.

Coriandrum, Signa.

Raucitatem facit, mentem mouet, similiter temulentis: loquuntur turpia, totum corpus coriandrum olet.

Remedium.

Potandum oleum irinum, & id ipsum clystere sumendum: atque tandem vinum meracum cum absinthio bibendū: & oua testa vacuata, & agitata, cum muria forbenda: & muria, & ius falsum gallinaceum, vel anserinum, bibendum.

Psyllium, Signa.

Totum corpus refrigerat: torpetque cum resolutione, atque tristitia, vt ani-

mum dispondeant.

Eaque præsidio sunt, quæ coriandro conueniunt.

Cicuta. Signa.

Caligo: vertigines, vt nec minimum videant: singultus, mentis alienatio: & artuum perfrectio: vltimo conuulsio, & suffocatio.

Remedium.

Vinum meracum potandum per interualla, quibus interuallis, absinthium cum pipere, & vino exhibendum, vel passum per se potandum.

Opium. Signa.

Veternus cum perfrectione & pruritu vehementi: & toto corpore odor veneni percipitur.

Remedium.

Merum copiosum cum absinthio, & cinnamomo, piper cum castorio, & oxymelite.

Excitandi sunt, naribus admotis hyssopo aceto intrito, vel pulegio, vel sternutatoriis insertis.

Aqua

Aqua calida, & balneis, fouendum corpus.

Carpesia. Signa.

Sopor & presens strangulatio. Eadem quæ cicutæ conueniunt remedia.

Mandragora. Signa.

Sopor, virium resolutio: validus veteranus, atque lethargicus.

Remedium.

Corpus excitetur, & commoueatur admotis acribus ad nares: & absinthium cum vino dulci sumendum. Caput aceto, & rosaceo fouendum.

Aconitum. Signa.

Lingua cum astrictione quadam dulcescit: inde vertigines: præsertim in surgendo, & oculorum humiditates: thoracis, & præcordiorum grauitas, vt multi erumpant flatus.

Remedium.

Chamæpitis, organū, marrubiū, aut abroto-

mum dispondeant.

Eaque præsidio sunt, quæ coriandro conueniunt.

Cicuta. Signa.

Caligo: vertigines, vt nec minimum videant: singultus, mentis alienatio: & artuum perfrictio: vltimo conuulsio, & suffocatio.

Remedium.

Vinum meracum potandum per interualla, quibus interuallis, absinthium cum pipere, & vino exhibendum, vel passum per se potandum.

Opium. Signa.

Veternus cum perfrictione & pruritu vehementi: & toto corpore odor veneni percipitur.

Remedium.

Merum copiosum cum absinthio, & cinnamomo, piper cum castorio, & oxymelite.

Excitandi sunt, naribus admotis hyssopo aceto intrito, vel pulegio, vel sternutatoriis infertis.

Aqua

Aqua calida, & balneis, fouendum corpus.

Carpesia. Signa.

Sopor & presens strangulatio. Eadem quæ cicutæ conueniunt remedia.

Mandragora. Signa.

Sopor, virium resolutio: validus veteranus, atque lethargicus.

Remedium.

Corpus excitetur, & commoueatur ad motis acribus ad nares: & absinthium cum vino dulci sumendum. Caput aceto, & rosaceo fouendum.

Aconitum. Signa.

Lingua cum astrictione quadam dulcescit: inde vertigines: præsertim in surgendo, & oculorum humiditates: thoracis, & præcordiorum grauitas, vt multi erumpant flatus.

Remedium.

Chamæpitis, organū, marrubiū, aut abroto-

abrotonum ex vino. Vinum in quo ferrum, aurum, vel argentum, extinctum est frequentius.

Ixia. Signa.

Linguae inflammatio; valida mentis abalienatio; omnium naturalium excretionum suppressio; murmura alui, ac strepitus: nec quicquam tamen eiicitur.

Remedium.

Absinthium cum vino diluto, copiosoque, aut cum aceto, vel oxymelite, vel castorium, & ruta, ex eisdem: & acetum calidum.

Ephemarum. Signa.

Totius corporis pruritus velut vrtica, aut squilla tactum: interiora roduntur: stomachus vritur, cum ponderosa grauitate, & malo inualecente, cruenta strigmentis mista, per aluum egeruntur.

Remedium.

Folia quercus, aut glandium, aut mallicorii,

licorii , aut serpilli decoctum cum lacte
bibendum : lac vaccinum calidum po-
tandum , & simul in ore continen-
dum.

Taxus. Signa.

Perfrictio totius corporis , strangula-
tus.

Remedium.

Omnia, quæ cicutæ conueniunt.

Solanum furiosum. Signa.

Gustum lactis representat ; singultus
crebri: linguæ humiditas, & larga sangui-
nis eductio.

Remedium.

Dulce vinum tepidum, cum anisi mo-
dico potum : amygdalæ, & elixa gallina-
rum pectora : chonchilia cruda pariter,
& tosta, in cibo: locustæ marinæ, & gam-
mari , & ex ipsis ius esculentum , potui
sumptum.

Sardonias. Signa.

Mentis alienatio : conuulsio cum la-
biorum

biorum contractionem; ut risus imaginem præbeat.

Remedium.

Aqua mulsa copiosa, & lactis potio, corporis inunctio ex calefacientibus, ubi prius in hydrelæ u descensum sit: a quo, corpus est vehementer infricandum, & inungendum.

Papauer corniculatum. LIII.

Eadem infert mala quæ opium, atque eadem therapeia curatur.

Pharicum. Signa.

Resolutio cum furore, ac conuulsione.

Remedium.

Cinnamomum, aut myrrha, ex vino: aut spicæ nardi ʒ.ii. myrrhæ oboli duo cum passo misti.

Caput derafum, farina hordeacea, cum ruta trita, & aceto, cataplasinatis modo inducendum.

Toxicum. Signa.

Labrorum, & linguæ inflammatio,
mentis

mentis furor, qui coerceri non potest, variis obnoxius imaginibus, feré desperatū malum est.

Remedium.

Vinculis continendi, & vi cogendi, vt vinum dulce, cum rosaceo bibant, redantque vomitū, & raporum semen cum vino potum, peculiariter cōuenit; & mala Cotonea his, cum pulegio potanda.

Fungi. Signa.

Strangulatus laqueis fimiles: interdum & intestina exulcerantur.

Remedium.

Lixiuuium ex sarmentis, aut pyrastri furculorum cinere cum posca, sale, vel nitro potum. Item pira siluestria, incocta, ac sumpta. Si exulcerentur intestina, detur absinthium, & ficuum decoctum, copiosé. Porro in calidam descendendum; & cruda hordeacea farina, cataplasmatibus modo, præcordiis admo- uenda.

Sanguis taurinus. Signa.

Spiritus

Spiritus difficultatem & strangulationem inducit : tonsillarum , & gutturis meatus valida conuulsione obstruendo, lingua rubet : & dentes tincti sanguine apparent.

Remedium.

Vomitum hinc fugiendus, atque primum incidendus sanguis coagulatus , & aluus ducenda; ut coagulo, cum aceto, sanguis attenuandus est , & clystere euocandus. Stomachus, ac venter, hordeacea farina cum aqua mulsa obducendus.

Ad lac coagulatum.

Lac coagulatum eadem parit symptomata : & eisdem remediis curatur. Atque hinc falsum nil offerri debet.

Ad mel heraclioticum.

Eadem parit symptomata cum aconito : & eisdem curatur remediis.

Haecenus ex vegetabilibus:

Sequuntur mineralia.

Ac

Ac primum Gypsum. Signa.

Strangulat in lapidem concrefcens.
Eadem conueniunt, quæ fungis debentur; & clyfter ex paffo, & maluis decoctis indatur.

Cerufca. Signa.

Singultus; tuffis, linguæ ficcitas, extremorum perfriçtio, cum mentis abalienatione, & difficili corporis motu.

Remedium.

Lixiuuium é vitium farmentis propinetur, lachrymæ thuris, vel prunorum gummi, aut vlmî humor, qui iſtius folliculis feruatur. & cum aqua tepida, vomitus quotidie citetur.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

Signa.

Ventris, & inteſtinorum, torſiones, cum vehementi roſione.

Remedium.

Vomitioes faciles: & aluum lubri-

M

cam

cam facientia, vt hibisci, & malue succus,
decoctum feminis, lini, tragi, orize, lac
copiosum: aqua mulsa, iura pingua, &
boni succi.

Argenti spuma. Signa.

Grauitas stomachi, ventris, & intesti-
norum, cum torsionibus validis: non-
nunquam & intestina pondere vulnerat,
& disrumpit: urinā supprimit: corpus in-
tumesceat, color fit plumbeus.

Remedium.

Agrestis hormini semen, cum vino.
myrrhæ oboli tres: absinthium: hyssopum
aut apii semē: aut piper, aut ligustri
flos, cum vino. palumbium finis aridus;
cum nardo, & vino.

Plumbum.

Similia præcedenti pericula infert: &
similia postulat remedia.

Argentum viuum.

Eadem quæ argenti spumæ conferunt,
& lac copiosè potum,

Vehementia cathartica : Veratrum album, T. sapia, elaterium, Agaricus niger, &c.

Sistenda purgatio somno, & quiete inductis, & constringentibus, & theriaca sumpta, & frictionibus.

Haustus ad Venena sumpta:

Sequuntur ad foris illata.

Foris ilatū est § Cum vulnere inflicto:
duplex: vel ¶ vel absque eo.

Si cum vulnere sit; supra vulnus pars deliganda; nō tamen nimis arctē: Homo adhibeatur, qui venenum ore puro, prius vino abluto, vel oleo ore contento, exsugāt. Deinde, si pars admittat, cucurbitula cum multa flamma affigenda, scarificata & ipsa prius, & partibus vicinis. vel vstio (si necesse sit adhibenda) & si natura lethale vulnus sit: & immedicabile: pars (si extremorum aliqua sit) praecidenda: sed id antequam venenum reliquum corpus peruat.

Si vulneratus plethoricus sit, sanguis mittatur.

Exhibendum autem cum cibis piper, aut allium, & vinum forte, & generosum bibendum: & parti imponatur acria, vt cepæ cum polenta, aut pane: vel porra, cum sale. Conuenit & acetum calidum superfundere in quo nepeta sit incocta: & gallinacei, & alia animalcula dissecta applicentur parti affectæ. Præterea bibant feryn, aut ericen, chamapytin, cinnamomum, vrticæ semen, & ante omnia theriaca: denique & sudores mouendi, & alui deiectiones.

Atque hæc omnia vulnerum venenatorum communia, Sequuntur propria, atque primum, Ad Canis rabiosi morsum, Signa.

Huius signa petenda primum à cane ipso; qui spectandus an rabidus sit. Signa: Canes rabidi, potum, & cibum, auersantur: siti premuntur: nec tamen bibunt: anhelant non parum: aures inclinant: saliuam, & copiosam, & spumantē edunt, muti prorsus, & veluti insani sunt, vt ne domesticos quidem agnoscant: insiliunt
sine

sine latratu hominibus, pariter & bestiis, mordentque: vbi momorderunt, statim nil molestiæ afferunt, præterquam ex vulnere. Et vt constet certo num rabidus sit, nucibus iuglandibus concisis, vulnus diligenter obstruatur: sequente die ablatae, gallinis in cibo apponantur: & si ederint (fame adactæ edent) ac sequente die moriantur ab eis, rabidus est qui momorderit.

Signa à symptomatis.

Hydrophobia (magna ex parte circa quadragesimum a morfu diem, quibusdam post sex menses, nonnullis sed id perraro, post septimum annum) cum cōuulsione totius corporis, rubore (præsertim faciei) sudore, & anxietate, omnem humorem fugiunt: alii canum more dilatrant, & obuium quemque dentibus petunt, & inficiunt malo.

Remedium.

Naturæ succurrendum, ante hydrophobiæ inuasionem, vbi constiterit rabiosum esse, & antequā rapiatur in corpus

venenum, aperientibus inductis, & ex alto reuocantibus: vt emplastro ex pice, acetosq; acerrimo, & opopanace, vel theriaca cum aqua vitæ affricetur, vel cepæ, & allia cum sale, ac ruta, inducantur, & caustica imponantur: & vlcus ad quadraginta dies apertum teneatur.

Vinum dulce, verustum, meracum potandū, & lac copiosè, & allia, porra, cepæ, in cibo sumenda: & antidotus ex cancris fluuiatilibus, thure, & gentiana, sumenda, & theriaca satis larga quātitate, & sæpius in die, ad dies quatuor vel quinque ante omnia Æscionis pharmacum ad rabidi morsum ex cancris fluuiatilibus. Purgatio item fiat ex helleboro, vel antimonio: præsertim si venenum iam corpus inuaserit, atque tum sudores, dropicismus, sinapismus, etiam toto corpore.

Medicamentum Æschionis ex cancris fluuiatilibus ita habet: Capiantur cancri fluuiatiles cum sol in leonem transierit, luna decima octaua: vrantur in patella æris rubri, donec in cinerem redigantur, vt in puluerem leuissimum redigi possint: Sume thuris partem vnā, quinque

que gentianæ, cancrorum decem. Huius medicamenti quotidie ad quadraginta dies detur mēſura cochlearis magni, cum aqua; atque ſi non protinus ab initio, ſed poſt aliquot dies cura ſuſcipitur, quotidie duo cochlearia ſumenda ſunt.

Vesparum, atque apium iſtus. Signa.

Dolor, pars rubet; propinquæ partes tument.

Remedium.

Bubulus ſimus, vel lutum illitum: farina hordeacea cum aceto: folia maluæ leuigata.

Phalangiorum morſus. Signa.

Locus rubefcit: & veluti punctus, per ambitum apparet: nec tumet, nec incaleſcit: ſed leuiter rubidus frigore, & pruritu, vexatur. Perfrictio: tremor corporis: grauitas: ſudor frigidus: dolor vagus, pallor, continua vrinæ excernendæ incitatio, quibuſdam vrinæ difficultas, colis intentio: oculi hument: inguina, & poplites intenduntur, rigentq; conuulſorio modo.

Valida stomachi rosio urget : lingua sermonem manifesté non explicat: vomitus aquæ, vel aranearum telis similium erumpit: quæ aliquibus & per urinam, & aluum descendunt.

Remedium.

Cinis ficulneus cum sale leui, ex vino maceratus, imponatur, vel aristolochiæ pulvis, cum farina hordeacea aceto madefactæ : & vlcus aqua salsa calida diligenter fouendum; & balneo frequenti utendum, & propinandum drachmas duas seminis abrotoni, anisi, vel aristolochiæ, vel trifolii herbæ semen. Et cancri fluuiatilis succum, cum lacte, & apii semine.

Ad araneæ ictum.

Signa.

Validi dolores circa media præcordia, rubor partis : urinæ difficultas, nonnunquam suffocatio.

Remedium.

Alliâ fumenda, & vinum meracum superbibendum.

Scorpionis. Signa.

Locus inflammari incipit; duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur: nunc feruor, nunc frigus vicissim inuadit: acceditque dolor qui modo decrescit; modo intenditur, sudor, horroris sensus, tremor extremorum, perfriectio, inguina attolluntur, pars urinditur: sæpe flatus, cum sonitu per sedem erumpit, pili rigent: cutis fit discolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus.

Remedium.

Lac ficulneum protinus instillandum: & ipse scorpius per se tritus, vulneri imponendus; & sulphur viuum resina, terebinthina exceptum. Propinandum autem aristolochiæ drachmas duas, præsertim corticis, cum vino, vel gentianam: vel trifolii, aut ocimi semen, balnea, & diaphoretica vini diluti, larga potio.

Ad Scolopendra morsum. Signa.

Locus affectus in orbem liuescit, & attollitur, interdum fæci similis: rarius ruber apparet, exulceraturque statim ab ipso

morsu, toto corpore pruriginis sensus percipitur: & si á marina impetiti sunt; aquosus, & pellucidus tumor efficitur: á terrestri, rubeus.

Remedium.

Plagæ imponatur sal hanc tritus: vel ruta leuigata: aut cinis aceto maceratus; aut scilla. Locus siveatur prius muria, cum aceto. Potui detur aristolochia, aut serpillum, aut calaminthæ, cum vino.

Ad stellionis morsum. Signa.

Intente dolent: & morsum liuidum habent.

Remedium.

Plaga cepis, & alliis integatur: eademque edantur, & vinum meracum superbibatur.

Ad felis morsum. Signa.

Validus dolor, locus affectus liuidus.

Remedium.

Eadem quæ ad stellionem, conferunt.

Mus

Mus araneus. Signa.

Dolores pulsatiles : & in singulis dentium eius animalis iētibus, rubores . Pustula surgit sanioso humore plena : propinquæ partes omnes liuent : cute pustula dirupta, album apparet vlcus, dilanatis membranis neruosis . Excidunt partes exesæ, depaſſione orta, his quæ serpunt simili . Etiam intestinorum tormina sequuntur : vrinæ difficultas ; & frigidi madoris vndique eruptio.

Remedium.

Mus ipse dissectus, applicetur : vel galbani splenium imponatur, vel sinapi cum aceto leuigatum . Mus ipse qui momorderit, exacté tritus, ex vino bibatur : aut agni hædiue coagulum vel gentianæ radix.

Vipera. Signa.

Dolor loci : tum totius corporis : in morſu duo foramina, paruo inuicem spatio discreta : atque ex his sanguis fluit, & humor saniosus : deinde oleosus, postremo etiã erugiosus. tumores iuxta morſum
subru-

188 *THERAPEUTICA.*

subrubri, liuidi, assurgentes: corpus decolor: vertigines oculorum: stomachi resolutio: animæ defectus; quibusdam vomitiones biliosæ: urinæ angustia: pustulæ in commorsa parte erumpentes, velut in ambustis. Tādē depassio inuadit ad viciniam procedens: ginginæ cruentantur: tremor: sopor frigidi sudores. Minus periculum est in maris viperæ morfu, quàm in femininæ: & minus vbi morfi cibum præsumpserint.

Remedium.

Alli esus, & vini meraci potio: item porra, cepæ & salsamentum quàm acerrimum, & theriacæ loco applicentur, gallinacei pulli dissecti & locus foueatur trifolii decocto, aut pulegii, aut muria, adiecto aceto.

Ad amphibana, & scytalæ.

Eadem symptomata, & therapeia.

Ad dryni ictum. Signa.

Tumor circa locum vitiatum cum rubore, pustulæ in circuitu assurgunt. Aliquan-

quando emanat aquosa sanies : stomachi
rosio vexat : & torsiones.

Remedium.

Aristolochia vino pota : & trifolium
herba , & cuiuscunque quercus fructus
leuigatus, & potatus.

Applicandæ autem ilicis radices tufæ:
quæ malo auxiliantur.

Ad Hemorrhoidum. Signa.

Validi cruciatus : quibus corporis ra-
ritates breues, atque angustæ, redduntur.
Multus é plaga sanguis erumpit : & quā-
quam citatrix inducatur , denuo rumpi-
tur : funditque sanguinem : cruenta ex-
cernuntur recrementa : sanguis qui de-
fluit in grumum concretus est : tussi san-
guinem ex pulmone reiiciunt , & euo-
munt.

Remedium.

Periculosissimum omnium hoc . Vitis
folia cocta, & cum melle leuigata, impo-
nantur , & hemorrhoi ipsius caput cre-
matum potui dandum : atque nisi matu-

ré

maturé occurratur, & priusquam symptomata vehementia eruperint, desperata salus est.

Ad dipsadē. Signa.

Ardor intolerabilis vrget, sitis tanta, vt nec extinguī, nec intermitteri possit: consimilisque totius corporis habitus consequitur, velut in hydropicis, propter assiduam potus ingestionem.

Remedium.

Eadem quæ ad hemorrhoum, præter ipsius caput: propriè, portulacæ folia trita ex aceto imponenda: item allium album, porrum, ruta, vrtica.

Ad natricem. Signa.

Vlcus factum dilatatur, & liuescens augetur: sanies ex eo nigra, copiosa, & foedi odoris, qualis ex depascente vlcere cernitur.

Remedium.

Applicetur origanum tritum, & aqua subactum; & lixiuia cum oleo indenda:

&

& querna radix minutim contrita . Bibantur autem binæ aristolochiæ drachmæ in potione poscæ ciathis duobus : & fauus recens cum aceto.

Ad cenchrum. Signa.

Morsus viperæ similis est : putredo comitatur : & carnes intumefactæ prius, (vt in aqua inter cutem) deffluunt : lethargo, veternoque premuntur.

Remedium.

Lactucæ, & lini semen, pariter mista, applicentur : & satureia trita . Potui detur centaurii radicis drachmæ duæ, cum terdis vini ciathis, vel aristolochiæ radix similiter.

Ad Ceraſtis morſum. Signa.

Locus ex duritie, & pustulis, intumescit : emanat ex vulnere sanies, modo nigra, modo subpallida, & porraceo colore . Totum corpus varicum modo, attollitur : genitale erigitur : mens alienatur : oculi obscurescunt : postremo tetanus.

Remedium

Remedium.

Membrum mutilatio quam mox à mor-
fu: & in his, & propinquis partibus, om-
nem carnem circum secare statim, & ra-
dicitus, vsque ad os excindero, oportet:
& reliquię ferro candenti adurendæ.

Ad aspidem. Signa.

Acus puncturæ similis existit & om-
nino exiguus sine tumore apparet: san-
guis exiguus & niger destillat: subita o-
culorum hebetudo inuadit & dolor cor-
poris multiplex admodum sed mitis nec
sine quadam voluptate: mutatur color,
& virescit: stomachi rosio exigua infe-
stat: frons continué reuellitur: palpebræ
sine sensu veluti in somno commouen-
tur.

Remedium.

Eadem quæ ceraſti debetur ac celerri-
mé maturandum.

Nam etiam intra septem vel octo ho-
ras mors aduentabit.

Ad Basiliscum. Signa.

Plaga subaureo colore tingitur.

Remedium.

Remedium.

Castorii drachmæ tres potandæ similiter & papaueris liquor.

Ad Pastinacam marinam. Signa.

Dolor pertinax & totius corporis stupor.

Remedium.

Hepar dissecandum & vulneri imponendum & vstus piscis & in pollinem redactus.

Ad murenam. Signa.

Eadem infert quæ viperæ morsus, & eandem therapeiam postulat.

Ad marinum draconem. Signa.

Ictis pars vulnerata grauitè dolet cum inflammatione febre animi deliquium gangrena, & necrosis nisi tempestiue succurrantur.

Remedium.

Imponenda cepa sub prunis cocta cum fermento & pauca theriaca, & pars incidenda scarificata, & theriaca cum aqua vitæ mista affricanda: porro piscis ipse dissectus vulneri medela est applicatus.

Ad Scorpionem marinum.

Sanatur ictus multo pisce dissecto & imposito, & sulphure viuo cum aceto in-

N

fricato.

fricato.

Ad crocodili morsum.

Adeps ipsorum impositus prius ylcere repurgato nitro cum melle trito.

Ad hominis ieiuni morsum prius leguminibus ex his praesertim lenticula vsum.

Remedium.

Vbi primum oleo morsum illeueris feniculi radice cum melle obducito aut lomentum cum poscha, & oxyrodino frequenter immutando.

Hactenus vulnere illata venena: Sequitur quae absque vulnere insicit contagione tantum.

Lues Venerea. Signa.

Huius pro corporis partiumque natura infinita excitantur symptomata. Cuiuscunque particulæ lues primum infederit, illic inherescens pustulam excitat, interdum ylcusculum. Deinde intro venæ cavæ sanguinem arterieque maioris spiritum labefactat, tumque bubo prorumpit in inguine, inde vasis spermaticis infectis ac renibus, gonorrhea virulenta. Cum in iecur, & ventriculum irrepsit malum, levis alui fluor atque vna cum iecore sanguis polluitur, profiliunt lividæ rubentæque

que pustulæ, vlcuscula crustosa & herpes, nōnullis vlcera caua atque maligna, biliosis phagedenica, melancholicis can-
crofa, pituitosis sordida tumoreque mu-
coso foetidoq; manantia, sanguineis cre-
briora & carbunculi effigies. Omnia la-
bris perduris tumentibus inuersis quæ
tandem carne exesa ossa depascunt pri-
mum tenella nasus tum solidiora quæ
tempore cariosa atque putrida excidunt.
Cum malum in cerebrū obrepserit om-
nia redundant pituitosis excrementis,
quæ capite interclusa magnum dolorem
& acerbum commouent. Sin in articulos
& ossium membranas ruat, his immanes
dolores excitantur motu præsertim affli-
gentes & in tophos & duros humores
concresecunt doloris haud expertes. In
ossium substantia: hæc ipsa diffunduntur
in tumorem, & tandem putrefaciunt: &
huius vapore maligno in cutim dilato,
pilorum diffluuium parit. Atque his om-
nibus malis, in vrinis nullum signum ma-
lum. Interdum male curata recidiua fit
post 30. annum: & raro per similis est ra-
dici: neque eadem habet symptoma-
ta: sed fere distillatione arthritide artuum

dolore, tophis, vel ossium carie, molesta: neque adeo contagiosa est. exitiosissima quæ aut a visceribus, aut a partibus obscœnis ortum ducit.

Remedium.

Therapeia luis venereæ duplex est: Guaiaci potione: vel illitu ex hydrargyro. Cæteræ inanes sunt: vel haud tanti momenti.

Ex Guaiaci potione.

Lignum Guaiaci recens, nigrum, & resinofum, lima in puluerem redigatur: huius pulueris selibra in aquæ fœtanæ tipidæ aut fluiuatilis libris sex diem vnũ maceretur: deinde lento admodũ igni (vase fictili vitrato, cooperculato) dum librę duę supersunt: etiam (morbo inueterato) dum quarta tantum pars supersit. Decoctum perfrigerari sinatur dum desideat: deinde percoletur: & in vitreũ vas indatur: post vas diligenter obstruendum. Atque hoc primum decoctum, valde medicamento-
sum est.

Aliud dilutius.

Sumatur noui pulueris Guaiaci selibra decoquatur in libris decem (vbi prius horas xv. maceratus fuerit) dum libræ 7. super-

perfint.

Poterunt utriq; decocto (vt iucundiora sint) passulæ, & glycyrrhiza incoqui.

Ergo hyeme in conclauī igni continuo calefacto & bene ventis & aëri obstructo ægrotus contineatur. Atq; alius primū ducatur ex medicamento phelgmagogo postridie purgationis si corpus plethoricum sit aperiatur vena basilica aut mediana. Deinde die tertio propinandū bis die ex valentiore decocto cyathus vel 3. vi. tepēs. hausto guaiaco, horis aliquot, interquiescendū lecto: & corpus strangulis operiendum ad sudorem. Sudandū autē quādiu vires ferant: atq; tum corpus sic candū: & electo surgendum, vbi corpus refrixerit, & cibus offerendus. post quartam a sumpto medicamento horam, ad nonam: vesperi, ad septimā. Alimēta esto tenuis succi: boni: ex assis, potius quā e-lixis, videlicet ex pullis colūbinis, & gal-
linaceis &c. Panis vero esto 3. 4. delicatioribus; validioribus, 3. vi. in diem. bellaria sint passulæ, modicum panis nautici biscocti, aut ad ignem exsiccati, aut intermedia panis crustula. Potus esto decoctū dilutius. Vinū, & venus, vt insensissima vi-

tentur, nisi vires valde infirmæ sint, at tñ præmissis cyathis decocti, esto illud vinum valde oligophorum. Inter pastus, tempus hilariter transigendum: & omnia negotia tota therapie historia intermittenda. Sin vero usu guaiaci sudores haud succedant, vtres aqua calente pleni, vel lapidentes candentes vino extincti, &c, sunt plantis & genibus admouendi tenuibus telis inuoluti, & totum caput calefaciendum, & diligenter integendum.

Sudore pro patientis viribus effuso, linteis calidis & corpus tergendum exsiccadumq; & leuibus frictionibus quod in partibus extremis hæserit dissipandum.

Sed imprimis caput est exercendum calidis pannis & diligenter perfricandū.

Interea toto curationis tempore seruetur aluus tenerrima ex carniū iusculo, vel decocto matutino incocta vel cassiæ fistulæ medulla semiuncię pondere, alternis diebus pastus initio.

Circa diem sextum ab inita cura oriri solent grauiā symptomata ex materia mota ac fusa. In ergo his obortis, vel imminētib; medicamento pro virium ratione satis valido pituitam vacuante purgan-

gandum eo die validiori decocto & sudore intermisso atq; deinceps post 6. vel 7. dies vtile erit simile catharticum sumere. Hæc ratio tenenda in grauitè affectis diutius ad diē quadragesimū aut quinquagesimū: recens inquinatis & leuiter affectis ad diem, 15. vel 20. Atq; sedatis omnibus symptomatis & doloribus perutile erit laconicū adire sumpto prius guaiaci decocto in ipso laconici ingressu atq; pro egroti viribus sudores dies aliquot mouere, & postea 6. vel 7. diebus iterū purgare. Tum validū decoctū prætermittere aquoso tantū in pastu bibito atq; demum sensim atq; lente consueta diæta suscipiēda. Sin estate crura suscipitur domo egrotus haud continendus, quin deterfis sudoribus matutinis, sumptoque cibo dum ad vespertinos sudores ventum sit quotidianis muniis vacare permittendum.

Hactenus ex Guaiaci decocto Lues cura:

Sequitur ex hydrargyri illitu.

R. Argenti viui expurgati & præparati ℥.vi: sulphuris viui ℥.ß. sublimati ℥.ß. axungia porci cum herbis cephalicis incoctæ & salis expertes li. vnam: vitellos ouorum sub cineribus coctorum nume-

ro tres: olei terebinthini, & laurini, an. ʒ. ii. theriacæ veteris, & mithridatię, an. ʒ. ʒ. fiat linimentum.

Ægro in angusto conclavi igni calefacto mane ieiuno (nisi vires infirmæ sint: tum namque hora ante litum iusculū summi poterit vel olei vitellus, &c.) oblinantur initio articuli tantum manuum, cubitorum, pedum, genuum; & humerorum, atque deinceps (robusto ægroto) & mali magnitudine postulāte, poterunt emuntoria oblini, totaque spina dorsi: vitatis semper visceribus, & partibus nobilibus. rictiones esto molles, & a partibus ductæ quæ minius dolent. Quibus corpora densa sunt, hi oblinendi bis die, mane, & vesperi, sex a prandio horis. Delicatiores corpora, & imbecilla, alternis tantū sunt perfricanda vel duobus diebus interpositis. Denique ita viribus consulendum, ut nil remaneat morbi: atque frictio tam diu, atque toties vsurpanda, dum malum extinctum sit, quod ex symptomatis cessantibus constabit.



